



Faglig kontakt under eksamen:

Trond Digernes 73 59 35 17  
Berner Larsen 73 59 35 25  
Lisa Lorentzen 73 59 35 48  
Vigdis Petersen 73 59 16 50

Vedlegg: Formelliste

## EKSAMEN I FAG SIF5005 MATEMATIKK 2

Bokmål

Fredag 12. mai 2000

Tid: 09:00–14:00

Hjelpebidrifter: B2 - Typegodkjent kalkulator med tomt minne.  
- Rottmann: *Matematisk Formelsamling*.

Sensuren faller i uke 25.

*Oppgave 1 skal besvares uten begrunnelse. På de andre oppgavene må det være med så mye tekst og mellomregning at resonnementet kommer tydelig frem. Rene kalkulatorsvar godtas ikke.*

**Oppgave 1** La  $T$  være legemet i første oktant begrenset av koordinatplanene  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$  og planet

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1.$$

Hvilke(t) av integralene nedenfor gir volumet av  $T$ ?

$$(i) \int_0^3 \int_0^{2-\frac{2z}{3}} \int_0^{2-y-\frac{2z}{3}} dx dy dz \quad (ii) \int_0^3 \int_0^{2-x} \int_0^{\frac{3}{2}(2-x-y)} dz dx dy$$
$$(iii) \int_0^2 \int_0^{2-x} \int_0^{\frac{3}{2}(2-x-y)} dz dy dx \quad (iv) \int_0^2 \int_0^{2-x} \frac{3}{2}(2-x-y) dy dx$$

**Oppgave 2** Finn og klassifiser de kritiske punktene til funksjonen

$$f(x, y) = x^3 - 3xy + \frac{1}{2}y^2.$$

**Oppgave 3** Et plant legeme  $R$  i første kvadrant er avgrenset av hyperblene

$$x^2 - y^2 = 1, \quad x^2 - y^2 = 2, \quad xy = \frac{1}{2} \quad \text{og} \quad xy = 1.$$

Innfør nye variable  $u = x^2 - y^2$  og  $v = xy$ , og bruk dette til å finne massen

$$m = \iint_R \delta \, dA$$

til  $R$  når massetettheten  $\delta$  er proporsjonal med kvadratet av avstanden til origo (proporsjonalitetsfaktor  $k$ ).

**Oppgave 4** I et punkt  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  på flaten  $z = x^2 - y^2$  er tangentplanet parallelt med planet  $z = 4x - 2y$ . Finn  $P_0$  og ligningen for dette tangentplanet.

**Oppgave 5** La  $R$  være det plane området i første kvadrant som er begrenset av  $x$ -aksen,  $y$ -aksen og kurven

$$2x^{3/2} + y^3 + 5xy = 1,$$

randen inkludert. Finn største og minste verdi av funksjonen  $f(x, y) = xy$  over området  $R$ .

**Oppgave 6** Kurven  $C$  er gitt ved

$$\mathbf{r}(t) = \sqrt{2} \cos t \mathbf{i} + \sqrt{2} \cos t \mathbf{j} + 2 \sin t \mathbf{k} \quad \text{for } 0 \leq t \leq 2\pi.$$

a) Bestem følgende størrelser i et vilkårlig punkt på kurven  $C$ :

- enhetstangentvektoren  $\mathbf{T}$
- krumningen  $\kappa$

b) Vis at  $C$  er skjæringskurven mellom en kuleflate og et plan. Bestem sentrum og radius i sirkelen  $C$ .

**Oppgave 7**

I denne oppgaven kan du få bruk for at

$$\int \cos^4 \theta d\theta = \frac{3\theta}{8} + \frac{3}{8} \sin \theta \cos \theta + \frac{1}{4} \cos^3 \theta \sin \theta + C.$$

La  $T$  være legemet begrenset av paraboloidene

$$z = x^2 + y^2 \quad \text{og} \quad z = 1 - (x - 1)^2 - y^2.$$

- a) Vis at projeksjonen av  $T$  i  $xy$ -planet er en sirkelskive, og finn volumet av  $T$ .
- b) La  $S_1$  være den delen av overflaten til  $T$  som ligger på paraboloiden  $z = 1 - (x - 1)^2 - y^2$ , og la  $S_2$  være den delen som ligger på paraboloiden  $z = x^2 + y^2$ . Både  $S_1$  og  $S_2$  er orientert slik at enhetsnormalen  $\mathbf{n}$  har positiv  $z$ -komponent. La videre vektorfeltet  $\mathbf{F}$  være gitt ved

$$\mathbf{F} = y \mathbf{i} + z \mathbf{j} + x \mathbf{k}.$$

Finn fluksen til  $\mathbf{F}$  gjennom flatene  $S_1$  og  $S_2$ , det vil si, beregn flateintegralene

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \quad \text{og} \quad \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

- c) Vektorfeltet  $\mathbf{G}$  er gitt ved

$$\mathbf{G} = e^{\sin z} \mathbf{i} + x \mathbf{j} - y \mathbf{k}.$$

Beregn kurveintegralet (linjeintegralet)

$$\oint_C \mathbf{G} \cdot d\mathbf{r} \quad (= \oint_C \mathbf{G} \cdot \mathbf{T} ds)$$

der  $C$  er skjæringskurven mellom de to paraboloidene, orientert mot urviseren sett ovenfra.

Hint: Kurven  $C$  ligger i et plan.

