



Faglig kontakt under eksamen:
Finn Faye Knudsen tlf. 73 59 35 23
Sigmund Selberg tlf. 73 55 02 84

EKSAMEN I TMA4130 MATEMATIKK 4N
Bokmål
Fredag 17. desember 2004
kl. 9–13

Hjelpemidler (kode C): Enkel kalkulator (HP 30S)
Rottmann: *Matematisk formelsamling*

Sensurdato: 15. januar 2005

Alle svar skal begrunnes, og det skal være med så mye mellomregning at fremgangsmåten fremgår tydelig av besvarelsen.

Oppgave 1

a) Finn den Laplacetransformerte av funksjonen $r(t)$ gitt ved

$$r(t) = \begin{cases} 0 & \text{for } t < 1, \\ 1 & \text{for } 1 < t < 2, \\ 0 & \text{for } t > 2 \end{cases}$$

b) Bruk Laplacetransformasjonen til å løse initialverdiproblemet

$$y'' + y = r(t) \quad \text{for } t > 0, \quad y(0) = y'(0) = 0,$$

hvor $r(t)$ er definert som i forrige punkt.

Oppgave 2

a) Finn alle løsninger på formen $u(x, t) = F(x)G(t)$ av differensialligningen

$$(1) \quad u_t = u_{xx}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0,$$

med randbetingelser

$$(2) \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t \geq 0.$$

Denne ligningen modellerer f.eks. temperaturfordelingen i en tynn metallstav.

b) I tillegg til (1) og (2) innfører vi nå initialbetingelsen

$$(3) \quad u(x, 0) = \sin(x) + \frac{1}{3} \sin(3x).$$

Finn $u(x, t)$ som oppfyller (1), (2) og (3).

Oppgave 3 Det oppgis at Fourierintegralet til en funksjon $f(x)$ kan skrives som

$$\int_0^{\infty} [A(w) \cos(wx) + B(w) \sin(wx)] dw$$

der

$$A(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos(wx) dx \quad \text{og} \quad B(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin(wx) dx.$$

a) Bestem funksjonene $A(w)$ og $B(w)$ for funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < 0, \\ e^{-x} & \text{for } x > 0. \end{cases}$$

(Vink: Formlene i Rottmann nederst på s. 144 kan spare deg mye regning.)

b) Bruk resultatet fra forrige punkt til å finne verdien av integralet

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos w}{1 + w^2} dw.$$

(Om du ikke klarte punkt (a), kan du likevel prøve å forklare hvordan du ville gå frem for å løse punkt (b).)

Oppgave 4 Sett opp dividert differansetabell for datasettet

x_k	0	1	2	3	4
$f(x_k)$	0	1	0	-1	0

og bruk Newtons interpolasjonformel til å finne et polynom som interpolerer datasettet.

Oppgave 5 Utfør én iterasjon med Gauss–Seidels metode på ligningssystemet

$$4x - y - z = 13$$

$$x - 5y - z = -8$$

$$2x - y - 6z = -2$$

med startverdier $x^{(0)} = 2$, $y^{(0)} = 2$, $z^{(0)} = 1$.

Oppgave 6 Vi betrakter initialverdiproblemet

$$(*) \quad x'' + x = 6 \cos t, \quad x(0) = 2, \quad x'(0) = 3.$$

- a) Skriv om (*) som et initialverdiproblem for et system av to førsteordens differensialligninger.
- b) Gjør ett skritt med Eulers metode, med skrittlengde $h = 0.1$, på systemet du fant i punkt (a). Hvis du ikke klarte punkt (a), kan du isteden bruke følgende initialverdiproblem:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - y, \\ \frac{dy}{dt} = -x + t, \end{cases} \quad \text{med} \quad \begin{cases} x(0) = 2, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

Formler i numerikk

- La $p(x)$ være et polynom av grad $\leq n$ som interpolerer $f(x)$ i punktene x_i , $i = 0, 1, \dots, n$. Forutsatt at x og alle nodene ligger i intervallet $[a, b]$, så gjelder

$$f(x) - p(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

Hvis nodene er jevnt fordelt (inkludert endepunktene), og $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$, da gjelder

$$|f(x) - p(x)| \leq \frac{1}{4(n+1)} M \left(\frac{b-a}{n} \right)^{n+1}$$

- Numerisk derivasjon:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{h}(f(x+h) - f(x)) + \frac{1}{2}hf''(\xi) \\ f'(x) &= \frac{1}{h}(f(x) - f(x-h)) - \frac{1}{2}hf''(\xi) \\ f''(x) &= \frac{1}{h^2}(f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)) - \frac{1}{12}h^2f^{(4)}(\xi) \end{aligned}$$

- Newtons metode for ligningssystemet $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ er gitt ved

$$\begin{aligned} \mathbf{J}^{(k)} \cdot \Delta \mathbf{x}^{(k)} &= -\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(k)}) \\ \mathbf{x}^{(k+1)} &= \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)} \end{aligned}$$

- Iterative teknikker for løsning av et lineært ligningssystem

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\begin{aligned} \text{Jacobi :} \quad x_i^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) \\ \text{Gauss-Seidel :} \quad x_i^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) \end{aligned}$$

- En 2. ordens Runge-Kutta metode (Heun) for $\mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y})$:

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_1 &= h \mathbf{f}(x_n, \mathbf{y}_n) \\ \mathbf{K}_2 &= h \mathbf{f}(x_n + h, \mathbf{y}_n + \mathbf{K}_1) \\ \mathbf{y}_{n+1} &= \mathbf{y}_n + \frac{1}{2} (\mathbf{K}_1 + \mathbf{K}_2) \end{aligned}$$

Se også formlene i Rottmann.

Tabell over Laplacetransformerte

$f(t)$	$\mathcal{L}(f)$
1	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n ($n = 0, 1, 2, \dots$)	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s - a}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
$e^{at} \cos \omega t$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2}$
$e^{at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}$