



LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TMA4135 MATEMATIKK 4D, 30.11.2005

**Løsning av oppgave 1** Setter vi  $Y = \mathcal{L}(y)$  og transformerer, får vi ligningen

$$sY - 1 + Y + \frac{Y}{s-1} = \frac{e^{-s}}{s}$$

Med litt regning gir dette

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} + e^{-s} \left( \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^3} \right)$$

Ved å transformere tilbake får vi ved hjelp av 2. skifteteorem at

$$y(t) = 1 - t - \frac{1}{2}u(t-1)(t^2 - 4t + 3).$$

**Løsning av oppgave 2** La  $S_1$  og  $S_2$  betegne summene av de gitte rekkene, henholdsvis.

Fra konvergensteoremet for Fourierrekker har vi (siden  $f$  er kontinuerlig overalt)

$$x^4 = \frac{\pi^4}{5} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8(-1)^n(\pi^2 n^2 - 6)}{n^4} \cos nx \quad \text{for } -\pi \leq x \leq \pi.$$

Sett  $x = \pi$  og bruk at  $\cos n\pi = (-1)^n$ . Det gir

$$\pi^4 = \frac{\pi^4}{5} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8(\pi^2 n^2 - 6)}{n^4} = \frac{\pi^4}{5} + 8S_1 \implies S_1 = \frac{1 - 1/5}{8} \pi^4 = \underline{\underline{\frac{\pi^4}{10}}}.$$

Parsevals identitet

$$2a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx$$

gir i vårt tilfelle

$$2 \left( \frac{\pi^4}{5} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{8(-1)^n(\pi^2 n^2 - 6)}{n^4} \right)^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^8 dx$$

dvs.

$$\frac{2\pi^8}{25} + 64S_2 = \frac{2\pi^8}{9} \implies S_2 = \frac{2\pi^8}{64} \left( \frac{1}{9} - \frac{1}{25} \right) = \underline{\underline{\frac{\pi^8}{450}}}.$$

**Løsning av oppgave 3****Punkt (a)**

Ligningen gir

$$F(x)[G''(t) + G'(t)] = F''(x)G(t) \implies \frac{G''(t) + G'(t)}{G(t)} = \frac{F''(x)}{F(x)} = k$$

der  $k$  må være konstant. Følgelig har vi

$$(1) \quad F''(x) = kF(x),$$

$$(2) \quad G''(t) + G'(t) = kG(t).$$

Randbetingelsen gir

$$(3) \quad F(0) = F(\pi) = 0.$$

Vi løser først randverdiproblemet (1), (3). Det er tre muligheter:

- $k > 0$ . Da skriver vi  $k = \mu^2$  der  $\mu > 0$ . Generell løsning blir da  $F(x) = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}$ , men (3) gir  $A = B = 0$ , så vi kan se bort fra  $k > 0$ .
- $k = 0$ . Gir generell løsning  $F(x) = Ax + B$ , men (3) gir  $A = B = 0$ , så vi kan se bort fra  $k = 0$ .
- $k < 0$ . Da skriver vi  $k = -\mu^2$  der  $\mu > 0$ . Generell løsning blir da  $F(x) = A \cos \mu x + B \sin \mu x$ , men (3) gir  $A = 0$  og  $B \sin \mu \pi = 0$ . Derfor må  $\mu = n$ , der  $n = 1, 2, 3, \dots$

Vi konkluderer at  $F(x) = F_n(x) = B_n \sin nx$ , svarende til  $k = -n^2$ , for  $n = 1, 2, 3, \dots$ . Nå løser vi (2) med  $k = -n^2$ , dvs.

$$G''(t) + G'(t) + n^2 G(t) = 0$$

Kar. lign. er  $\lambda^2 + \lambda + n^2 = (\lambda + \frac{1}{2})^2 + n^2 - \frac{1}{4} = 0$ , som har røtter

$$\lambda = -\frac{1}{2} \pm i\sqrt{n^2 - \frac{1}{4}}.$$

Derfor er

$$G(t) = G_n(t) = e^{-t/2} \left( C_n \cos t\sqrt{n^2 - \frac{1}{4}} + D_n \sin t\sqrt{n^2 - \frac{1}{4}} \right)$$

og vi konkluderer:

$$u_n(x, t) = F_n(x)G_n(t) = e^{-t/2} \left( C_n \cos t\sqrt{n^2 - \frac{1}{4}} + D_n \sin t\sqrt{n^2 - \frac{1}{4}} \right) B_n \sin nx$$


---

men vi kan sette  $B_n = 1$  (vi har allerede to vilkårlige konstanter  $C_n$  og  $D_n$ , så  $B_n$  kan "bakes inn" der).

### Punkt (b)

Her er det bare  $u(x, t) = u_4(x, t)$  som kan komme i betraktning. Vi har fra svaret på forrige punkt (med  $B_n = 1$ ),

$$u(x, 0) = C_4 \sin 4x \quad \underbrace{= 0}_{\text{fra initialbet.}} \quad \implies C_4 = 0.$$

Vi står derfor igjen med

$$u(x, t) = e^{-t/2} D_4 \sin \frac{t\sqrt{63}}{2} \sin 4x$$

Men da er

$$u_t(x, t) = -\frac{1}{2} e^{-t/2} D_4 \sin \frac{t\sqrt{63}}{2} \sin 4x + e^{-t/2} D_4 \frac{\sqrt{63}}{2} \cos \frac{t\sqrt{63}}{2} \sin 4x$$


og innsatt  $t = 0$ :

$$u_t(x, 0) = D_4 \frac{\sqrt{63}}{2} \sin 4x \quad \underbrace{= \sin 4x}_{\text{fra initialbet.}} \quad \implies D_4 = \frac{2}{\sqrt{63}}.$$

Svaret er altså

$$u(x, t) = e^{-t/2} \frac{2}{\sqrt{63}} \sin \frac{t\sqrt{63}}{2} \sin 4x.$$

Her et plot av løsningen:



**Løsning av oppgave 4**

Vi har (se s. 176 i Rottmann for def.)

$$\begin{aligned}
 \hat{f}(w) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} e^{-iwx} dx \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} \cos wx dx - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} \sin wx dx}_{= 0 \text{ pga. odde funksjon i } x} \\
 &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-x} \cos wx dx \quad (\text{integranden er like funksjon av } x) \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-x} \cos wx dx \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left[ \frac{e^{-x}}{1+w^2} (-\cos wx + w \sin wx) \right] \Big|_{x=0}^{x=\infty} \quad (\text{Rottmann s. 144, nr. 133}).
 \end{aligned}$$

Men  $x = \infty$  gir ikke noe bidrag, siden  $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \cos wx = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \sin wx = 0$ . Får derfor

$$\hat{f}(w) = \underline{\underline{\sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{1+w^2}}}.$$

Fra inversjonsformelen har vi

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(w) e^{iwx} dw$$

dvs.

$$\begin{aligned}
 e^{-|x|} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iwx}}{1+w^2} dw \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos wx}{1+w^2} dw + \frac{i}{\pi} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin wx}{1+w^2} dw}_{= 0 \text{ pga. odde funksjon av } w} \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos wx}{1+w^2} dw \quad (\text{integranden er like funksjon av } w)
 \end{aligned}$$

og ved å sette  $x = 1$  får vi da:

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos wx}{1+w^2} dw = \frac{\pi}{2e}$$

som skulle vises.

**Løsning av oppgave 5**

Vi bruker tilnærmelsene

$$u_{xx}(i \cdot h, j \cdot h) \approx \frac{1}{h^2}(u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j})$$

og

$$u_{yy}(i \cdot h, j \cdot h) \approx \frac{1}{h^2}(u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}) .$$

Dette gir ligningene

$$\begin{aligned} \frac{1}{h^2}(1 - 2u_{11} + u_{21}) + \frac{1}{h^2}(1 - 2u_{11} + u_{12}) &= -1 \\ \frac{1}{h^2}(u_{11} - 2u_{21} + 1) + \frac{1}{h^2}(1 - 2u_{21} + 1) &= -1 \\ \frac{1}{h^2}(1 - 2u_{12} + 1) + \frac{1}{h^2}(u_{11} - 2u_{12} + 1) &= -1 . \end{aligned}$$

Setter inn  $h = 1/4$  og får ligningene

$$\begin{aligned} -4u_{11} + u_{21} + u_{12} &= -33/16 = -2.0625 \\ u_{11} - 4u_{21} &= -49/16 = -3.0625 \\ u_{11} - 4u_{12} &= -49/16 = -3.0625 . \end{aligned}$$

Disse har løsningene

$$u_{11} = 115/112 = 1.0268, u_{12} = u_{21} = 229/224 = 1.0223$$

## Løsning av oppgave 6

Systemet kan ikke løses ved hjelp av Jacobi-iterasjoner slik det står, siden koeffisienten  $a_{33} = 0$ .

Men ved å sette den siste ligningen først får vi:

$$\begin{aligned} 4x_1 - x_2 &= 2 \\ 4x_1 - 16x_2 + 4x_3 &= 2 . \\ -x_2 + 4x_3 &= 4 \end{aligned}$$

Ikke bare kan Jacobi-iterasjonene utføres, men dette systemet er også diagonal-dominant, og vi kan være sikre på at iterasjonene konvergerer.

En iterasjon gir:

$$\begin{aligned} x_1^{(1)} &= \frac{1}{4} \left( 2 + x_2^{(0)} \right) = \frac{3}{4} = 0.750 \\ x_2^{(1)} &= -\frac{1}{16} \left( 2 - 4x_1^{(0)} - 4x_3^{(0)} \right) = \frac{3}{8} = 0.375 \\ x_3^{(1)} &= \frac{1}{4} \left( 4 + x_1^{(0)} \right) = \frac{5}{4} = 1.250. \end{aligned}$$

**Løsning av oppgave 7**

Ved å sette  $y_1 = y$  og  $y_2 = y'$  får vi systemet:

$$\begin{aligned}y_1' &= y_2 \\y_2' &= -(2y_1 + y_1^3 + 0.5y_2).\end{aligned}$$

Når dette skal løses med Heuns metode, lønner det seg å skrive systemet på vektorform. Med  $y_1(0) = y(0) = 1$  og  $y_2(0) = y'(0) = 0$  blir det

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(\mathbf{y}) = \begin{bmatrix} y_2 \\ -(2y_1 + y_1^3 + 0.5y_2) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Første skritt med Heuns metode med  $h = 0.1$

$$\begin{aligned}\mathbf{k}_1 &= h\mathbf{f}(\mathbf{y}_0) = 0.1 \begin{bmatrix} 0 \\ -(2 \cdot 1 + 1^3 + 0.5 \cdot 0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0 \\ -0.3 \end{bmatrix} \\ \mathbf{y}_0 + \mathbf{k}_1 &= \begin{bmatrix} 1.0 \\ -0.3 \end{bmatrix} \\ \mathbf{k}_2 &= h\mathbf{f}(\mathbf{y}_0 + \mathbf{k}_1) = 0.1 \begin{bmatrix} -0.3 \\ -(2 \cdot 1 + 1^3 + 0.5 \cdot (-0.3)) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.03 \\ -0.285 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

og til slutt

$$\mathbf{y}_1 = \mathbf{y}_0 + \frac{1}{2}(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2) = \begin{bmatrix} 0.9850 \\ -0.2925 \end{bmatrix}$$

Andre skritt:

$$\begin{aligned}\mathbf{k}_1 &= h\mathbf{f}(\mathbf{y}_1) = 0.1 \begin{bmatrix} -0.2925 \\ -(2 \cdot 0.9850 + 0.9850^3 + 0.5 \cdot (-0.2925)) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.0293 \\ -0.2779 \end{bmatrix} \\ \mathbf{y}_1 + \mathbf{k}_1 &= \begin{bmatrix} 0.9558 \\ -0.5704 \end{bmatrix} \\ \mathbf{k}_2 &= h\mathbf{f}(\mathbf{y}_1 + \mathbf{k}_1) = 0.1 \begin{bmatrix} -0.5794 \\ -(2 \cdot 0.9558 + 0.9558^3 + 0.5 \cdot (-0.5704)) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.0570 \\ -0.2499 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

og til slutt

$$\mathbf{y}_2 = \mathbf{y}_1 + \frac{1}{2}(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2) = \begin{bmatrix} 0.9419 \\ -0.5564 \end{bmatrix}$$

Så  $y(0.1) \approx 0.9850$  og  $y(0.2) \approx 0.9419$ .

**Løsning av oppgave 8** Vi regner først ut gradienten.

$\text{grad}f =$

$$[2yz(e^x + e^y - e^z) + 2xyze^x]\mathbf{i} + [2xz(e^x + e^y - e^z) + 2xyze^y]\mathbf{j} + [2xy(e^x + e^y - e^z) - 2xyze^z]\mathbf{k}.$$

Evaluering i punktet  $P : (1, -1, -1)$  gir oss

$$\text{grad}f|_P = 4e\mathbf{i} + (-2e + 2e^{-1})\mathbf{j} + (-2e - 2e^{-1})\mathbf{k}.$$

Enhetsvektoren vinkelrett både på  $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{k}$  og  $\mathbf{b} = \mathbf{j} - \mathbf{k}$  og som har negativ  $\mathbf{k}$ -komponent er  $\mathbf{e} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k})$ .

Vi finner at den retningsderiverte er

$$D_{\mathbf{e}}f|_P = \frac{8e}{\sqrt{3}}.$$