



Faglig kontakt under eksamen:  
Xavier Raynaud: tlf. 73 59 35 46

## EKSAMEN I MATEMATIKK 4D (TMA4135)

Bokmål  
Onsdag 13. desember 2006  
kl. 9–13

Hjelpemidler (kode C): Enkel kalkulator(HP 30S)  
Rottmann: *Matematisk formelsamling*

Sensurdato: 12.01.2007

Alle svar skal begrunnes, og det skal være med så mye mellomregning at fremgangsmåten fremgår tydelig av besvarelsen.


### Oppgave 1

a) Finn  $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s(s^2+s-2)}\right)$ ,  $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{e^{-s}}{s(s^2+s-2)}\right)$  og  $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{e^{-2s}}{s(s^2+s-2)}\right)$

b) Løs

$$y''(t) + y'(t) - 2y(t) = r(t)$$

med  $y(0) = y'(0) = 1$  og der  $r$  er gitt ved den følgende grafen



**Oppgave 2** Finn den Fouriertransformerte til funksjonen  $h(x) = (e^{-x^2} * e^{-x^2})$ .

Bruk resultatet til å finne et uttrykk for  $h(x)$  uten integraltegn og  $*$ .

Du kan få bruk for formelen  $\mathcal{F}(e^{-ax^2}) = \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-w^2/4a}$ .

**Oppgave 3** Gitt to randverdiproblem

$$(*) \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & t > 0, x \in (0, 1), \\ u(0, t) = a, & t > 0, \\ u(1, t) = b, & t > 0, \end{cases}$$

der  $a, b \in \mathbb{R}$ , og

$$(**) \quad \begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} - \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0, & t > 0, x \in (0, 1), \\ v(0, t) = 0, & t > 0, \\ v(1, t) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

Vi minner om at et randverdiproblem består av en differensialligning *med* randbetingelse.

- a) Hvis  $u_1$  og  $u_2$  begge løser randverdiproblemet  $(*)$  (det vil si, hvis både  $u_1$  og  $u_2$  er løsninger av  $(*)$ ), hvilke randverdiproblemer løser da henholdsvis  $u_1 + u_2$  og  $u_1 - u_2$ ? Holder superposisjonsprinsippet for randverdiproblemene  $(*)$  og  $(**)$ ?
- b) La  $u(x, t)$  være en løsning av randverdiproblemet  $(*)$  og la  $v(x, t)$  være definert ved

$$v(x, t) = u(x, t) - [a + (b - a)x].$$

Vis at  $v(x, t)$  løser randverdiproblemet  $(**)$ .

Bestem alle løsninger av  $(**)$  på formen

$$v(x, t) = F(x)G(t).$$

- c) La  $a = -1$  og  $b = 1$  i  $(*)$ . Finn løsningen  $u(x, t)$  av initial/randverdiproblemet gitt ved  $(*)$  og initialkravet

$$(***) \quad u(x, 0) = \sin(\pi x), \quad x \in (0, 1).$$

**Oppgave 4**

- a) Finn polynomet  $p(t)$  med lavest mulig grad som interpolerer

$t_n$	-2	-1	0	1	2
$p(t_n)$	12	0	0	6	12

b) Bruk Simpsons regel til å regne ut

$$\int_{-2}^2 p(t) dt$$

med knuter (nodes) i punktene  $-2, -1, 0, 1, 2$ .

Sammenlikn svaret med den eksakte verdien av integralet og forklar det du ser.


**Oppgave 5** I et anisotrop materiale der varmekonduktivitet i  $y$ -retningen er to ganger høyere enn i  $x$ -retningen tar den stasjonære varmeligningen formen

$$(1) \quad u_{xx} + 2u_{yy} = 0.$$

Vi vil løse (1) numerisk. Området er et kvadrat med sidelengde 1 og randbetingelser er gitt ved

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= u(0, y) = 0 \\ u(x, 1) &= u(1, y) = 1 \end{aligned}$$

for  $x, y$  i  $[0, 1]$ . Vi betrakter det følgende gitteret



der  $h = \frac{1}{3}$  og  $U_{i,j} \approx u(ih, jh)$ .

a) Vis at differenseskjemaet som tilsvarende (1) er

$$U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + 2U_{i,j+1} + 2U_{i,j-1} - 6U_{i,j} = 0.$$

b) Sett opp systemet som  $U_{i,j}$  ( $i, j = 1, 2$ ) tilfredstiller og gjør et steg ved hjelp av Gauss Seidel iterasjon med startpunktet  $U_{1,1}^0 = U_{2,1}^0 = U_{1,2}^0 = U_{2,2}^0 = \frac{1}{2}$ .

## Tabell over Laplacetransformerte

$f(t)$	$\mathcal{L}(f)$
1	$\frac{1}{s}$
$t$	$\frac{1}{s^2}$
$t^n$ ( $n = 0, 1, 2, \dots$ )	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$e^{at}$	$\frac{1}{s - a}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
$e^{at} \cos \omega t$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2}$
$e^{at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}$

## Formler i numerikk

- La  $p(x)$  være et polynom av grad  $\leq n$  som interpolerer  $f(x)$  i punktene  $x_i, i = 0, 1, \dots, n$ . Forutsatt at  $x$  og alle nodene ligger i intervallet  $[a, b]$ , så gjelder

$$f(x) - p(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

Hvis nodene er jevnt fordelt (inkludert endepunktene), og  $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ , da gjelder

$$|f(x) - p(x)| \leq \frac{1}{4(n+1)} M \left( \frac{b-a}{n} \right)^{n+1}$$

- Numerisk derivasjon:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{h}(f(x+h) - f(x)) + \frac{1}{2}hf''(\xi) \\ f'(x) &= \frac{1}{h}(f(x) - f(x-h)) - \frac{1}{2}hf''(\xi) \\ f''(x) &= \frac{1}{h^2}(f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)) - \frac{1}{12}h^2f^{(4)}(\xi) \end{aligned}$$

- Newtons metode for ligningssystemet  $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$  er gitt ved

$$\begin{aligned} \mathbf{J}^{(k)} \cdot \Delta \mathbf{x}^{(k)} &= -\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(k)}) \\ \mathbf{x}^{(k+1)} &= \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)} \end{aligned}$$

- Iterative teknikker for løsning av et lineært ligningssystem

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\begin{aligned} \text{Jacobi :} \quad x_i^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{ii}} \left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) \\ \text{Gauss-Seidel :} \quad x_i^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{ii}} \left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) \end{aligned}$$

- En 2. ordens Runge-Kutta metode (Heun) for  $\mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ :

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_1 &= h \mathbf{f}(x_n, \mathbf{y}_n) \\ \mathbf{K}_2 &= h \mathbf{f}(x_n + h, \mathbf{y}_n + \mathbf{K}_1) \\ \mathbf{y}_{n+1} &= \mathbf{y}_n + \frac{1}{2} (\mathbf{K}_1 + \mathbf{K}_2) \end{aligned}$$