


# Stokastisk Variabel (SV)

- En stokastisk variabel  $X$  er en reel funksjon på utfallsrommet  $S$

$$X : S \rightarrow \mathcal{R}$$

$$X(e) = x$$



- Stor bokstav  $X$  for den stokastiske variabelen
- Liten bokstav  $x$  for en bestemt realisering  $X(e) = x$

To situasjoner:

**Diskret** hvis mengden av mulige realisering er endelig eller tellbar

**Kontinuerlig** hvis mengden av mulig realisering er ikke tellbart, typisk  $\mathcal{R}$ , eller  $(a, \infty)$  eller  $(a, b)$

# Diskret Stokastisk variabel - I

Hvordan beskriver vi en diskret SV  $X$

- **Sannsynlighet fordeling** (punkt sannsynlighet)

$$P(X = x) = f(x)$$

- Merk:  $P(X = x) = P(e \in \mathcal{S} | X(e) = x)$
- Egenskaper til  $f$ 
  - $0 \leq f(x) \leq 1$  for alle mulige verdier av  $x$
  - $\sum_x f(x) = 1$
- **Kumulative sannsynlighet fordeling**



$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} f(t)$$

- Egenskaper til  $F$ 
  - $0 \leq F(x) \leq 1$
  - $F(x)$  er en voksende trappe-funksjon

# Diskret Stokastisk variabel - II

Kast 3 mynt:  $X = \{\text{antall kroner}\}$

$x$	$P(X = x)$
0	$1/8$
1	$3/8$
2	$3/8$
3	$1/8$



- $f(x)$  er definert bare på de verdiene som  $X$  kan ta mens  $F(x)$  er definert over hele  $\mathcal{R}$
- Differanse mellom " $<$ " of " $\leq$ " er viktig
  - I vårt eksampel er
  - $P(X < 0) = 0$
  - $P(X \leq 0) = 1/8$

- **Sannsynlighet fordeling** (sannsynlighetstetthet)

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$


- Egenskaper til  $f$ 
  - $f(x) \geq 0$  for alle  $x \in \mathcal{R}$
  - $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

- **kumulative sannsynlighet fordeling**

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$

- Egenskaper til  $F$ 
  - $0 \leq F(x) \leq 1$
  - $F(x)$  er en stigende, kontinuerlig funksjon

# Kontinuerlig Stokastisk variabel - II



- $f(x) > 1$  er mulig. Dette er ikke en sannsynlighet
- Differanse mellom " $<$ " of " $\leq$ " er ikke viktig



$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b)$$

- $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$
- For en kontinuerlig SV er

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

der den deriverte eksisterer.

# Kontinuerlig Stokastisk variabel - II



- $f(x) > 1$  er mulig. Dette er ikke en sannsynlighet
- Differanse mellom " $<$ " of " $\leq$ " er ikke viktig

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b)$$

- $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$
- For en kontinuerlig SV er

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

der den deriverte eksisterer.

- Time 1: Simultan og marginal sannsynlighet fordeling
- Time 2: Betinget sannsynlighetsfordeling



# Eksempel

- Vi har registrert vekt og høyde av 202 atleter

$$X = \{\text{Vekt}\}$$

$$Y = \{\text{Høyde}\}$$



# Exempel

- Vi har registrert vekt og høyde av 202 atleter

$$X = \{\text{Vekt}\}$$

$$Y = \{\text{Høyde}\}$$


- Vi kan se på fordeling av de to variablene hver for seg



- Hva hvis vi ønsker å si noe om forholdet mellom  $X$  og  $Y$ ?
  - Er de høyeste også tyngeste?


# Exempel

- Hva hvis vi ønsker å si noe om forholdet mellom  $X$  og  $Y$ ?
  - Er de høyeste også tyngeste?



# Exempel

- Hva hvis vi ønsker å si noe om forholdet mellom  $X$  og  $Y$ ?
  - Er de høyeste også tyngeste?



- Vi trenger en måte å beskrive  $X$  of  $Y$  samtidig: vi trenger en simultan fordeling!

# Eksempel for $f(x, y)$

		x			$h(x)$
		0	1	2	
y	0	0.07	0.20	0.07	
	1	0.27	0.27	0	
	2	0.12	0	0	
$g(x)$					1

# Eksempel for $f(x, y)$

		x			$h(x)$
		0	1	2	
y	0	0.07	0.20	0.07	0.34
	1	0.27	0.27	0	0.54
	2	0.12	0	0	0.12
$g(x)$		0.46	0.47	0.07	1