

# Hypotesetesting

Torstein Fjeldstad

Institutt for matematiske fag, NTNU

01.11.2018

# I dag



- Introduksjon til hypotesetesting
- Teststyrke/styrkefunksjon
- Generell framgangsmåte



# Introduksjon til hypotesetesting

## Eksempel



Vil undersøkje om ein ny medisin  $B$  er betre enn eksisterande medisin  $A$

- Eksisterande medisin  $A$  verker på 70% av pasientane
- Ny medisin  $B$  påstås å verke på meir enn 70% av pasientane

## Eksempel



Vil undersøkje om ein ny medisin  $B$  er betre enn eksisterande medisin  $A$

- Eksisterande medisin  $A$  verker på 70% av pasientane
- Ny medisin  $B$  påstås å verke på meir enn 70% av pasientane

Korleis kan me konkludere om  $B$  er betre enn  $A$ ?

## Eksempel



Vil undersøkje om ein ny medisin  $B$  er betre enn eksisterande medisin  $A$

- Eksisterande medisin  $A$  verker på 70% av pasientane
- Ny medisin  $B$  påstås å verke på meir enn 70% av pasientane

Korleis kan me konkludere om  $B$  er betre enn  $A$ ?

Tester medisin  $B$  på  $n = 25$  pasientar. Observerer betring for  $x = 20$ .

# Hypotesetesting



	$H_0$ riktig	$H_1$ riktig
Forkast $H_0$	Type I-feil	Ok
Ikkje forkast $H_0$	Ok	Type II-feil

# Hypotesetesting



	H <sub>0</sub> riktig	H <sub>1</sub> riktig
Forkast H <sub>0</sub>	Type I-feil	Ok
Ikkje forkast H <sub>0</sub>	Ok	Type II-feil

Ide: vi må vere "sikre" før me påstår at H<sub>1</sub> er rett. Me velg signifikansnivået  $\alpha$  liten og krev

$$P(\text{Type I-feil}) = P(\text{Forkast } H_0 \text{ når } H_0 \text{ er riktig}) \leq \alpha$$

$$\beta = P(\text{Type II-feil}) = P(\text{Ikkje forkast } H_0 \text{ når } H_1 \text{ er riktig})$$



## Fortsetjing eksempel



Finn  $k$  s.a.  $P(X \geq k \text{ når } p_B = 0.7) \leq 0.05$ .

## Fortsetjing eksempel



Finn  $k$  s.a.  $P(X \geq k \text{ når } p_B = 0.7) \leq 0.05$ .

$$\text{— } P(X = 25) = \binom{25}{25} 0.7^{25} 0.3^0 = 0.0001$$

$$\text{— } P(X = 24) = \binom{25}{24} 0.7^{24} 0.3^1 = 0.0014$$

$$\text{— } P(X = 23) = \binom{25}{23} 0.7^{23} 0.3^2 = 0.0073$$

$$\text{— } P(X = 22) = \binom{25}{22} 0.7^{22} 0.3^3 = 0.0243$$

$$\text{— } P(X = 21) = \binom{25}{21} 0.7^{21} 0.3^4 = 0.0572$$

## Fortsetjing eksempel



Finn  $k$  s.a.  $P(X \geq k \text{ når } p_B = 0.7) \leq 0.05$ .

$$— P(X = 25) = \binom{25}{25} 0.7^{25} 0.3^0 = 0.0001$$

$$— P(X = 24) = \binom{25}{24} 0.7^{24} 0.3^1 = 0.0014$$

$$— P(X = 23) = \binom{25}{23} 0.7^{23} 0.3^2 = 0.0073$$

$$— P(X = 22) = \binom{25}{22} 0.7^{22} 0.3^3 = 0.0243$$

$$— P(X = 21) = \binom{25}{21} 0.7^{21} 0.3^4 = 0.0572$$

$$— P(X \geq 25) = 0.0001$$

$$— P(X \geq 24) = 0.0015$$

$$— P(X \geq 23) = 0.0089$$

$$— P(X \geq 22) = 0.0332$$

$$— P(X \geq 21) = 0.0904$$

## Fortsetjing eksempel



Finn  $k$  s.a.  $P(X \geq k \text{ når } p_B = 0.7) \leq 0.05$ .

$$— P(X = 25) = \binom{25}{25} 0.7^{25} 0.3^0 = 0.0001$$

$$— P(X = 24) = \binom{25}{24} 0.7^{24} 0.3^1 = 0.0014$$

$$— P(X = 23) = \binom{25}{23} 0.7^{23} 0.3^2 = 0.0073$$

$$— P(X = 22) = \binom{25}{22} 0.7^{22} 0.3^3 = 0.0243$$

$$— P(X = 21) = \binom{25}{21} 0.7^{21} 0.3^4 = 0.0572$$

Må velge  $k = 22$

$$— P(X \geq 25) = 0.0001$$

$$— P(X \geq 24) = 0.0015$$

$$— P(X \geq 23) = 0.0089$$

$$— P(X \geq 22) = 0.0332$$

$$— P(X \geq 21) = 0.0904$$

# Sannsyn type-II feil




Figure:  $\beta = P(X < 22 \text{ n\aa}r p_B > 0.7) = \sum_{x=0}^{21} \binom{25}{x} p_B^x (1 - p_B)^{25-x}$



# Styrkefunksjon

# Teststyrke/styrkefunksjon



## Definisjon

Styrken til ein test er sannsynet for å forkaste  $H_0$  gitt at ein spesifikk alternativ hypotese  $\theta_1$  er sann

- teststyrken er  $1 - \beta(\theta_1)$
- teststyrken er ein funksjon av  $\theta_1$
- desto høgare styrke, desto høgare sannsyn for at me klarer å konkludere med at den alternative påstanden er sann når den spesifikke alternative hypotesen er sann.

# Styrkefunksjon




Figure:  $1 - \beta = 1 - P(X < 22 \text{ når } p_B > 0.7) = 1 - \sum_{x=0}^{21} \binom{25}{x} p_B^x (1 - p_B)^{25-x}$





# Generell framgangsmåte

## Utledning av konfidensintervall

Situasjon: Anta  $X_1, X_2, \dots, X_n$  tilfeldig utval frå  $f(x; \theta)$ -populasjonen. Ynskjer eit  $(1 - \alpha) \cdot 100\%$  konfidensintervall for  $\theta$ .

1. Finn ein estimator for  $\theta$ ,  $\hat{\theta}$  (t.d. SME)
2. La  $Z = h(\hat{\theta}, \theta)$  der  $h(\cdot, \cdot)$  er ein funksjon s.a.  $Z$  har ei kjend fordeling.
3. Då har me at

$$P(z_{1-\alpha/2} \leq h(\hat{\theta}, \theta) \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

4. Løys ulikskapane (mhp.  $\theta$ ) kvar for seg og finn eit uttrykk med  $\theta$  i midten

$$P(\hat{\theta}_L(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq \theta \leq \hat{\theta}_U(X_1, X_2, \dots, X_n)) = 1 - \alpha$$

5. Et  $(1 - \alpha) \cdot 100\%$  konfidensintervall for  $\theta$  er

$$\left[ \hat{\theta}_L(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_U(X_1, X_2, \dots, X_n) \right]$$

# Generell framgangsmåte

Situasjon:  $X_1, X_2, \dots, X_n$  tilfeldig utval med  $X_i \sim f(x_i; \theta)$ .

1. Ynskjer å teste:

a)  $H_0 : \theta = \theta_0$  mot  $H_1 : \theta > \theta_0$

b)  $H_0 : \theta = \theta_0$  mot  $H_1 : \theta < \theta_0$

c)  $H_0 : \theta = \theta_0$  mot  $H_1 : \theta \neq \theta_0$

2. Finn ein estimator for  $\theta$ ;  $\hat{\theta}$

3. La  $Z = h(\hat{\theta}, \theta_0)$ , der  $h(\cdot, \cdot)$  er ein funksjon s.a.  $Z$  har ei kjend fordeling **gjeve  $H_0$**

4. Bestem eit forkastningskriterium (antar  $Z$  stor når  $\hat{\theta}$  stor)

a) Forkast  $H_0$  dersom  $Z > k$

b) Forkast  $H_0$  dersom  $Z < k$

c) Forkast  $H_0$  dersom  $Z < k_l$  eller  $Z > k_u$

der  $k$  bestemmes frå kravet

$$P(\text{Forkast } H_0 \text{ når } H_0 \text{ er riktig}) \leq \alpha$$

5. Sett inn tal og konkluder

## Neste veke



- p-verdi
- Fleire eksempel hypotesetesting
- Lineær regresjon