

Institutt for matematiske fag

## Eksamensoppgåve i **TMA4245 Statistikk**

**Fagleg kontakt under eksamen:** Håkon Tjelmeland, Arvid Næss

**Tlf:** 48221896, 99538350

**Eksamensdato:** 5.juni 2015

**Eksamenstid (frå-til):** 09:00 - 13:00

**Hjelpemiddelkode/Tillatne hjelpemiddel:** C:

- Tabeller og formler i statistikk, Tapir forlag,
- K.Rottman. Matematisk formelsamling,
- Eit stempla gult A5-ark med egne handskrivne formlar og notat,
- Kalkulator: HP30S, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College eller Casio fx-82ES PLUS.

**Annan informasjon:**

Alle svar skal grunngjevast, og besvarelsen skal innehalde naturleg mellomrekning.

Sensur: 26. juni 2015

**Målform/språk:** nynorsk

**Sidetal:** 4

**Sidetal vedlegg:** 0


**Kontrollert av:**

---

Dato

Sign



**Oppgave 1 Dataplott**

Figur 1: Parvise data frå ei simultanfordeling.

Figur 1 viser parvise utfall av to stokastiske variablar  $X$  (horisontalt) og  $Y$  (vertikalt).

- a) Gje eit anslag på korrelasjonen mellom  $X$  og  $Y$ . Skriv ei kort grunngjeving. Forventingsverdien og standardavviket for kvar av dei to variablane har heiltalsverdiar. Gje eit anslag for desse verdiane ved å studere Figur 1 visuelt.

**Oppgave 2**

Gå ut i frå at  $A$  og  $C$  er uavhengige hendingar, og at  $B$  og  $C$  er uavhengige hendingar.

- a) Kan  $A \cap B$  og  $C$  vere avhengige? Kan  $A \cup B$  og  $C$  vere avhengige? (Vink: Sjå til dømes på tilfellet  $A \cap B \cap C = \emptyset$ .)  
Kan  $A \cup B$  og  $C$  være avhengige dersom  $A$  og  $B$  er disjunkte?

**Oppg ve 3 Kvalitetskontroll**

Ein farmas ytisk fabrikk produserer ein medisin i flytande form som skal seljast p  flasker med oppgjeve innhald. Denne medisinen inneheld ein viktig komponent som krev at ein f retek ein jamleg kontroll av kvaliteten. Dette blir gjort ved at ein for kvar produksjonsserie tek ut eit tilfeldig utval flasker der innhaldet blir analysert. Kvar gong ein serie pr ver blir analysert, analyserer ein samstundes ei kontroll ysing med kjent konsentrasjon 0.10 mg/l. Dette gjer ein for   sikre at analysemetoden er rett kalibrert. Sidan analysemetoden ikkje er heilt presis, vil den m lte konsentrasjonen variere. Utfallet av analysen av kontroll ysinga kan reknast som ein normalfordelt stokastisk variabel  $X$  med forventingsverdi  $\mu$  og varians  $\sigma^2$ , der  $\sigma^2$  er variansen i m lefeilen for analysemetoden og  $\mu$  under normale omstende er lik 0.10 mg/l.

Ei *alarmhending*  $A$  for analysemetoden er definert ved at den m lte verdien  $X$  i kontroll ysinga avvik meir enn eit standardavvik fr  konsentrasjonen 0.10 mg/l, alts   $|X - 0.1| > \sigma$  (dvs.  $X < 0.1 - \sigma$  eller  $X > 0.1 + \sigma$ ). Ei *aksjonshending*  $B$  er definert ved at den m lte verdien  $X$  i kontroll ysinga avvik meir enn 2 standardavvik fr  0.10 mg/l, dvs.  $|X - 0.1| > 2\sigma$ .

a) G  ut i fr  (berre i dette punktet) at  $\sigma = 0.01$  mg/l.

Rekn ut  $P(B)$  og  $P(B | A)$  n r  $\mu = 0.10$  mg/l.

G  ut i fr  at ei forureining har kome inn i pr va, slik at  $\mu = 0.11$  mg/l, og rekn ut  $P(B)$ .

G  i resten av oppg va ut i fr  at  $\mu = 0.10$  mg/l. For   estimere  $\sigma^2$  skal vi nytte m leresultata  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , fr   $n$  uavhengige analyser av kontroll ysinga. Vi kan derfor sj  p   $x_1, x_2, \dots, x_n$  som utfall fr   $n$  uavhengige stokastiske variablar  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , der kvar  $X_i, i = 1, \dots, n$ , har same fordeling som den stokastiske variabelen  $X$ .

b) Vis at sannsynsmaksimeringsestimatoren (SME) for  $\sigma^2$  er

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

Sjølvs om  $\mu$  er kjent, kan ein og bruke estimatoren

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

der  $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n$ .

I dei neste punkta kan du bruke utan bevis at

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2/\sigma^2 \text{ og } \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2/\sigma^2$$

er  $\chi^2$ -fordelte (kjikvadratfordelte) med  $n$  og  $n-1$  fridomsgrader i gitt rekkjefølge.

c) Vis at både  $\hat{\sigma}^2$  og  $S^2$  er forventingsrette.

Kven av dei to estimatorane vil du velje? Grunnjev svaret.

Resultata målt i mg/l av 20 analyser av kontrolløysinga har gjeve  $\sum_{i=1}^{20} x_i = 1.9240$  og  $\sum_{i=1}^{20} x_i^2 = 0.1866$ .

d) Bestem eit 90 %-konfidensintervall for  $\sigma^2$  ved å nytte estimatoren du kom fram til var den beste i (c).

#### Oppgåve 4

Let  $X_1, \dots, X_n$  vere eit tilfeldig utval (uavhengige, identisk fordelte stokastiske variablar) frå ei eksponensialfordeling med ukjent parameter  $\mu$ , dvs. frå ei fordeling med sannsynstettleik

$$f(x) = \frac{1}{\mu} e^{-\frac{x}{\mu}}; \quad x \geq 0, \quad \mu > 0.$$

Nullhypotesen  $H_0 : \mu = 1$  skal testast mot alternativet  $H_1 : \mu < 1$ . I første omgang skal du nytte testobservatoren

$$T = \min\{X_1, \dots, X_n\},$$

a) Vis at sannsynstettleiken til  $T$  er

$$f_T(t) = \frac{n}{\mu} e^{-\frac{nt}{\mu}}; \quad t \geq 0.$$

Bestem forventningsverdien og variansen til  $T$ .

Testen som baserer seg på bruk av  $T$ , forkastar  $H_0$  for små verdier av  $T$ . Dette kan ein formulera på denne måten:

Test1: Dersom  $T < c_1$ , forkastar ein  $H_0$ .

Signifikansnivået for testane i denne oppgåva er  $\alpha$ .

**b)** Vis at

$$c_1 = \frac{1}{n} \ln \frac{1}{1 - \alpha}.$$

SME for  $\mu$  er utvalgsgjennomsnittet  $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n$ .

**c)** Formulér ein Test2 basert på  $\bar{X}$ . Bestem ei tilnærma sannsynsfordeling til  $\bar{X}$ , og finn (tilnærma) det kritiske området for Test2 dersom du kan gå ut i frå at  $n \geq 30$ , .

**d)** Finn eit uttrykk for teststyrken for kvar av dei to testane ( $n \geq 30$ ). (Teststyrke er sannsynet for å forkaste  $H_0$  når  $H_0$  ikkje er rett; styrken avheng av eit skjerpa alternativ.)

Kva for ein test er best? Kvifor? Du får lov til å basere konklusjonen din på resultat rekna ut for  $\alpha = 0.05$ ,  $n = 30$ , og skjerpa alternativ hypotese  $H_1' : \mu = 0.8$ .

Kvifor er Test1 ein dårleg test?