

- Transformasjon av variable
- Moment
- Momentgenererande funksjon

## Teorem 7.3

La  $X$  vere ein kontinuerleg stokastisk variabel med sannsynsfordeling  $f(x)$ . La  $Y = u(X)$ , ein 1-1 transformasjon mellom  $X$  og  $Y$ , slik at  $y = u(x)$  gjev  $x = w(y) = u^{-1}(y)$ . Sannsynsfordelinga til  $Y$  er då

$$g(y) = f[w(y)]|J|$$

der  $J = w'(y)$  er Jacobianen til transformasjonen.


## Teorem 7.5

La  $X$  vere ein kontinuerleg stokastisk variabel med sannsynsfordeling  $f(x)$ . La  $Y = u(X)$ , definere ein transformasjon som ikkje er 1-1. Dersom intervallet  $X$  er definert over kan delast opp i  $k$  parvis disjunkte intervall, s.a. kvar av inversfunksjonane  $x_k = w_k(y)$  definerer ein 1-1 transformasjon. Då er

$$g(y) = \sum_{i=1}^k f[w_i(y)]|J_i|$$

der  $J_i = w'_i(y)$  for  $i = 1, 2, \dots, k$ .

# Felles forventning og varians



## Definisjon 7.2

Den momentgenererande funksjonen  $M_X(t)$  til ein stokastisk variabel  $X$  er gjeve ved  $E[\exp(tX)]$ :

- $M_X(t) = E(\exp(tX)) = \sum_{\forall x} f(x) \exp(tx)$
- $M_X(t) = E(\exp(tX)) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \exp(tx) dx$

## Teorem 7.6

La  $X$  vere ein stokastisk variabel med momentgenererande funksjon  $M_X(t)$ . Då er  $r$ -te moment

$$\mu'_r = \frac{d^r M_X(t)}{dt} \Big|_{t=0}$$

## Definisjon 4.2

La  $X$  og  $Y$  vere to stokastiske variable med simultanfordeling  $f(x, y)$ , og  $g(x, y)$  ein funksjon. Då er  
dersom diskre

$$\mu_{g(X, Y)} = E[g(X, Y)] = \sum_x \sum_y g(x, y) f(x, y)$$

dersom kontinuerleg

$$\mu_{g(X, Y)} = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

### Teorem 7.7

La  $X$  og  $Y$  vere stokastiske variable med momentgenererande funksjonenar hhv  $M_X(t)$  og  $M_Y(t)$ .

$M_X(t) = M_Y(t) \Rightarrow X$  og  $Y$  har identisk sannsynsfordeling.

### Teorem 7.8 og 7.9

- $M_{X+a}(t) = e^{at} M_X(t).$
- $M_{aX}(t) = M_X(at).$

### Teorem 7.10

La  $X_1, X_2, \dots, X_n$  vere uavhengige stokastiske variable med momentgenererande funksjonar hhv.  $M_{X_1}(t), M_{X_2}(t), \dots, M_{X_n}(t)$ .

La  $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ . Då er

$$M_Y(t) = M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t) \dots M_{X_n}(t)$$

- Transformasjon av variable
  - Diskret
  - Kontinuerleg (1-1 transformasjon)
- Moment

*Teng meir enn forventning og varians for å beskrive sannsynsfordeling*
- Momentgenererande funksjon (*for å finne fordeling til lineærtransformasjon*)

## Teorem 7.11

La  $X_1, X_2, \dots, X_n$  vere uavhengige normalfordelte variable med  $E(X_i) = \mu_i$  og  $\text{Var}(X_i) = \sigma_i^2$ .

La  $Y = a_0 + a_1X_1 + \dots + a_nX_n$ . Då er

$$y \sim N(a_0 + a_1\mu_1 + \dots + a_n\mu_n, a_1^2\sigma_1^2 + \dots + a_n^2\sigma_n^2)$$