



Faglig kontakt under eksamen: Kari Hag
TLF: 73 59 35 21 / 483 01 988 (Mobil)

Eksamen i MA1103 Flerdimensjonal analyse

Dato: Mandag 2. juni 2008
Tid: 9:00 – 13:00
Hjelpemidler: Godkjent kalkulator
Vedlagt Formelark og Formelliste
Bokmål
Sensur: 23 juni

Oppgave 1 La

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{når } xy = 0 \\ 2008 & \text{ellers} \end{cases}$$

Begrunn at f har partielle deriverte i $(0, 0)$. Er f deriverbar ("differentiable") i $(0, 0)$?

Oppgave 2 La $z = f(x, y)$ og la (r, θ) være polarkoordinatene til (x, y) . Anta videre at betingelsene for kjerneregelen er oppfylt. Finn $\frac{\partial z}{\partial r}$ og $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ uttrykt ved $\frac{\partial z}{\partial x}$ og $\frac{\partial z}{\partial y}$, og vis at

$$\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2.$$

Oppgave 3 Finn maksimum og minimum av $f(x, y) = 27xy(1 - x - y)$ over trekanten med hjørner $(0, 0)$, $(1, 0)$ og $(0, 1)$.

Oppgave 4 Beregn det itererte integralet

$$\int_0^1 \left[\int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy \right] dx$$

ved å innføre polarkoordinater.

Oppgave 5 Finn massen av ei halvkule med radius a når massetettheten δ er proporsjonal med kvadratet av avstanden til sentrum. Dvs. med kulas sentrum i origo er $\delta(\mathbf{r}) = k|\mathbf{r}|^2$ for en positiv konstant k .

Oppgave 6 Gitt vektorfeltet $\mathbf{v}(x, y) = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$ der ω er en konstant. Hva blir verdien av linjeintegralet

$$\oint_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$$

når C er en sirkel med radius a ?

Oppgave 7 Finn en funksjon $f(x)$ slik at linjeintegralet

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

bare avhenger av endepunktene til C når $\mathbf{F} = \langle 2xyz, x^2z, yf(x) \rangle$.

Oppgave 8 La $\mathbf{F} = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3}$ der $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

(a) Vis at $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$.

(b) Vis at

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} dS \neq 0$$

når S er ei kuleflate med sentrum i $(0, 0, 0)$. Hvorfor er ikke dette i strid med divergensteoremet?

Oppgave 9 La $m, n \in \mathbb{N}$ og beregn dobbeltintegralet

$$\iint_R (x - y)^m (3y - x)^n dx dy$$

der R er parallelogrammet med hjørner i $(0, 0)$, $(3, 1)$, $(5, 3)$ og $(2, 2)$.

(Hint: Det lønner seg å bytte variable.)

LØSNINGSSKISSER MA1103

Vanlige
forhold!
Ktt.

Oppgave 1 f er 0 på aksene slik at
 $f_x(0,0) = 0 = f_y(0,0)$. f er ikke deriverbar
 i $(0,0)$ da f ikke engang er kontinuert i $(0,0)$.

Oppgave 2 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. Altså er

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial z}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial z}{\partial y}$$


$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial z}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial z}{\partial y}$$

slik at

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial z}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial \theta} \right)^2 &= \left(\cos \theta \frac{\partial z}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 + \left(-\sin \theta \frac{\partial z}{\partial x} + \cos \theta \frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 \\ &= (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 \\ &= \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2. \end{aligned}$$

Oppgave 3 En kont. funksjon på et lukket

begrenset område har så vel maks. som min.
 Oppnås på randen eller i indre
 punkt der $f_x = f_y = 0$.



Da $f(x,y) = 27xy(1-(x+y))$, er f lik 0 på randen.

Kritiske punkt i det indre:


$$\left. \begin{aligned} f_x &= 27y(1-x-y) - 27xy = 27y(1-2x-y) = 0 \\ f_y &= 27x(1-2y-x) = 0 \end{aligned} \right\}$$

Indre kritisk punkt: $\left. \begin{aligned} y+2x &= 1 \\ x+2y &= 1 \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow x=y=\frac{1}{3}$

Maksimum: $f(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \underline{\underline{1}}$ Minimum: $\underline{\underline{0}}$

Oppgave 4


$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2+y^2) dy dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^2 r dr d\theta = \underline{\underline{\frac{\pi}{8}}}$$



Oppgave 5

Massen er gitt ved

$$k \iiint_H \delta(x,y,z) dV = k \iiint_H (x^2+y^2+z^2) dV$$



$$\begin{aligned} & \text{Hemiskule)} \\ & = k \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^a \rho^2 \cdot \rho^2 \sin\phi d\rho d\phi d\theta = 2\pi \frac{a^5}{5} [-\cos\phi]_0^{\frac{\pi}{2}} = \underline{\underline{\frac{2k\pi}{5} a^5}} \end{aligned}$$

Oppgave 6

$$\omega \oint_C -y dx + x dy = \omega \iint_{\text{Green}^R} 2 dA = \underline{\underline{2\pi a^2 \omega}}$$



Har antatt C positivt orientert; i motsatt fall blir svaret $-2\pi a^2$.

Alternativt $x-x_0 = a \cos t$, $y-y_0 = a \sin t$; $0 \leq t \leq 2\pi$,

$$\begin{aligned} & \text{slik at } \omega \oint_C -y dx + x dy \\ & = \omega \int_0^{2\pi} [-(y_0 + a \sin t) (-a \sin t) + (x_0 + a \cos t) (a \cos t)] dt \\ & = \underline{\underline{2\pi \omega a^2}} \end{aligned}$$

Bemerk. Om du legger sentrum (x_0, y_0) til $(0,0)$, vil jeg trekke lite/ingenting!

Oppgave 7

Søker $f(x)$ slik at $\text{curl } F = 0$:

$$\text{curl } F = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xyz & x^2z & yf(x) \end{vmatrix} = \langle f(x) - x^2, 2xy - yf'(x), 0 \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \underline{f(x) = x^2}$$

Da feltet $F = \langle 2xyz, x^2z, x^2y \rangle$ er definert i hele $\mathbb{R}^3$ (og glatt), er linjeintegralet uavhengig av vegen; feltet er konservativt.

Oppgave 8

$$F = \left\langle \frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \right\rangle$$

$$a) \frac{\partial F_1}{\partial x} = \frac{(x^2+y^2+z^2)^{3/2} - \frac{3}{2}(x^2+y^2+z^2)^{1/2} \cdot 2x^2}{(x^2+y^2+z^2)^3}$$

Vi får tilsvarende uttrykk for $\frac{\partial F_2}{\partial y}$ og $\frac{\partial F_3}{\partial z}$, og til sammen

$$\begin{aligned} \nabla \cdot F &= \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} = \frac{3(x^2+y^2+z^2)^{3/2} - 3(x^2+y^2+z^2)^{1/2}(x^2+y^2+z^2)}{(x^2+y^2+z^2)^3} \\ &= \underline{\underline{0}} \end{aligned}$$

$$b) \oint_S F \cdot \hat{N} dS = \oint_S \frac{1r}{|r|^3} \cdot \frac{1r}{|r|} dS = \oint_S \frac{1}{a^2} dS = 4\pi \neq 0$$

Detta er ikke i strid med divergens-teoremet da F ikke er definert (enn si kontinuert) i $(0,0,0)$ som omslutes av S .


Oppgave 9

Vi innfører $u = x - y$, $v = 3y - x$ og har

$$\left| \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \right| = \left| \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} \right| = \left| \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \right| = 2, \text{ slik at}$$

$$\left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = \frac{1}{2}. \text{ Videre har vi } (x,y) \rightarrow (u,v), \text{ dvs.}$$

$$(0,0) \rightarrow (0,0), (3,1) \rightarrow (2,0), (5,3) \rightarrow (2,4), (2,2) \rightarrow (0,4).$$



$$\begin{aligned} \int_R (x-y)^m (3y-x)^n dx dy &= \frac{1}{2} \int_0^4 \int_0^2 u^m \cdot v^n du dv \\ &= \frac{2^m \cdot 4^{n+1}}{(m+1)(n+1)} \\ &= \left(\frac{2^{m+2n+2}}{(m+1)(n+1)} \right) \end{aligned}$$