

Øvingsoppgaver

① Finn $\frac{dy}{dx}$.

a) $y = \sqrt{x^3}$ b) $y = (x^2 + 4x)^{5/2}$ c) $y = \frac{x^4 + x^2}{x^2 + x + 1}$

d) $y = 9x^{-1}$ e) $y = \sqrt{\frac{1}{5x^6}}$ f) $y = \frac{6x^2 + \sqrt{x}}{4}$

g) $y = \sqrt{1 + \sin\sqrt{x}}$ h) $y = \sqrt{x^6 + x^4}$

② Finn maks og min for funksjonen

$$h(x) = x + \frac{1}{x}.$$

③ Olav Tryggvason-statuen på torvet i Trondheim er 3,9 meter høy og står på en 16,75 m høy sokkel av granitt. La $\theta(t)$ være vinkelen som solens stråler danner med det horisontale torvet ved tidspunktet t . Hvor fort øker lengden av skyggen av statuen idet $\theta = \pi/6$, dersom $\theta'(t) = -\pi/30$ rad/time?

④ Vis at funksjonen har nøyaktig ett nullpunkt, og bruk Newtons metode til å finne en tilnærmet verdi for dette med to slike desimaler.

a) $x^3 + 3x + 9$

b) $x + \sin x + 1$

⑤ Finn en tilnærmet verdi for π med 9 slike desimaler ved å bruke Newtons metode til å løse ligningen $\sin x = \frac{1}{2}$.

⑥ Et tomt rektangulært svømmebasseng med lengde 25m og bredde 10m fylles med vann, 500 l/min. Bassenen har en helling på $\pi/6$ med horisontalplanet i lengderetningen. Hvor fort stiger vannhøyden i bassenget etter 10 minutter? Enn etter 65 timer?

⑦ Vis at $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$; $n \geq 1$.

Eksamensoppgaver

- ① Finn ligningen for tangenten til kurven

$$2xy + \sin y = 2\pi$$

i punktet $(1, \pi)$.

- ② Vis at funksjonen

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{x-2}{2}\right) - 2\arcsin\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)$$

er konstant for $0 \leq x \leq 4$. Hva er funksjonens konstante verdi?


- ③ Vis at grafen til ligningen

$$x^3 + y^3 = xy - 1$$

ikke har horisontal tangent ($dy/dx = 0$) i noen punkter.

- ④ En wire med lengde L deles i to deler. Den ene delen bøyes til et kvadrat og den andre til en likesidet trekant. Avgjør hvordan wiren skal deles for at summen av de to arealene skal bli minst mulig.

- ⑤ Et åpent trau er formet som på figuren, bunnflata er et rektangel med bredde x og lengde y . Endeflatene er plane flater som består av et rektangel og to kvartsirkler med radius 2. Trauet har et gitt volum $V = 16\pi$.



Finn dimensjonene (x og y) av trauet når arealet A av overflata (dvs. bunnflata, de to endeflatene og de to krumme sideflatene) er minst mulig.

- 6) Volumet av en kuleformet ballong øker med konstant vekstrate lik 8 cm^3 pr. minutt.
 Hvor fort øker radien på det tidspunktet da radien er nøyaktig 10 cm?
 Hvor fort øker arealet av ballongens overflate ved det samme tidspunktet?

- 7) a) Gitt funksjonen
 $f(x) = x^{\alpha-1} - \alpha \ln x, \quad x > 0$

der α er en konstant, $\alpha > 1$.

Vis at $f(x)$ oppnår sin minimumsverdi for $x = [\frac{\alpha}{\alpha-1}]^{1/(\alpha-1)}$. For hvilke verdier av α er minimumsverdien negativ?

- b) Gjør rede for at ligningen

$$x^{1/3} - \frac{4}{3} \ln x = 0$$

har nøyaktig to løsninger. Velg en startverdi x_0 og bruk Newtons metode til å finne tilnærningsverdier x_1, x_2 for den største av de to løsningene.

8) Vis at $\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} i^2 = (-1)^{n+1} \frac{n(n+1)}{2}; n \geq 1$.