



Faglig kontakt under eksamen:  
Ivar Amdal tlf. 995 59 273

## EKSAMEN I TMA4115 MATEMATIKK 3

Torsdag 10. august 2006

Kl. 9–13

Hjelpemidler (kode C): Enkel kalkulator (HP30S), med tilhørende bruksanvisning  
Rottman: *Matematisk formelsamling*

Sensurdato: 1. september

*Med unntak av flervalgsoppgaven (oppgave 5) skal alle svar begrunnes, og det skal gå klart frem hvordan svarene er oppnådd.*

**Oppgave 1** Bestem alle komplekse tall  $z = x + iy$  som oppfyller ligningen

$$z^2 = i|z|^2.$$

### Oppgave 2

a) Løs initialverdiproblemet

$$y'' + 4y' + 5y = 0$$

med betingelsene  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$ .

b) Finn generell løsning av ligningen

$$y'' + 5y' + 6y = 0.$$

Finn  $y(x)$  som løser

$$y'' + 5y' + 6y = e^{-2x} - 12x - 10.$$

c) De reelle tallene  $a$  og  $b$  er slik at ligningen

$$y'' + \frac{a}{x}y' + \frac{b}{x^2}y = 0, \quad x > 0$$

har basis av løsninger  $y_1 = x$  og  $y_2 = x^2$ . Finn generell løsning av den ikke-homogene ligningen

$$y'' + \frac{a}{x}y' + \frac{b}{x^2}y = 2, \quad x > 0.$$

**Oppgave 3** Gitt ligningssystemet

$$\begin{aligned} 2ax + ay + 3z &= 4a \\ x + (a-1)z &= a \\ x + y - z &= 1. \end{aligned}$$

- a) Bestem, for hver verdi av parameteren  $a$ , antall løsninger av ligningssystemet.  
 b) Løs ligningssystemet når  $a = 3$ .

**Oppgave 4** La

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -6 & -4 \end{bmatrix}.$$

- a) Bestem alle egenverdier og egenvektorer til  $A$ .  
 b) Finn en matrise  $P$  og en diagonalmatrise  $D$  slik at  $A = PDP^{-1}$ . Benytt dette til å beregne matrisen  $A^{2006}$ .  
 c) Løs følgende system av differensialligninger:

$$\begin{aligned} y_1' &= 3y_1 + 2y_2 \\ y_2' &= -6y_1 - 4y_2 \end{aligned}$$

når  $y_1(0) = 1$  og  $y_2(0) = -3$ .

**Oppgave 5** *Flervalgsoppgave.*

*Svar uten begrunnelse ved å velge ett alternativ. Riktig svar: full score, galt svar: null score.*

- a) La  $\mathbf{x}$  og  $\mathbf{y}$  være kolonnevektorer i  $\mathbb{R}^3$ , der ingen av dem er nullvektor. Definer matrisen  $A = \mathbf{xy}^T$ . Hva er dimensjonen til nullrommet til  $A$ ?

**A:** 0

**B:** 1

**C:** 2

**D:** 3

- b) Gitt en  $5 \times 4$ -matrise  $A$  slik at  $\text{Row}(A)$  har basis  $\mathbf{v}_1 = (1, 7, -2, 3)$  og  $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 4, -3)$ . Hvilket av alternativene under er en basis for  $\text{Null}(A)$ ?

$$\begin{array}{ll} \mathbf{A}: & \left\{ \begin{bmatrix} 30 \\ -3 \\ -3 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -3 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix} \right\} & \mathbf{B}: & \left\{ \begin{bmatrix} -30 \\ 3 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix} \right\} \\ \mathbf{C}: & \left\{ \begin{bmatrix} -6 \\ 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -4 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ -2 \\ 11 \\ 14 \end{bmatrix} \right\} & \mathbf{D}: & \left\{ \begin{bmatrix} 12 \\ -3 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 24 \\ -3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\} \end{array}$$

**Oppgave 6** Matrisen  $A$  og vektoren  $\mathbf{b}$  er gitt ved

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Finn minste-kvadrat løsningen til ligningssystemet  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ . Hva er den ortogonale projeksjonen av  $\mathbf{b}$  på kolonnerommet til  $A$ ?