



Faglig kontakt under eksamen:
Anne Kværnø tlf. 73 59 35 42
Sigmund Selberg tlf. 73 55 02 84

EKSAMEN I TMA4130 MATEMATIKK 4N

Bokmål

Onsdag 30. november 2005

kl. 9–13

Hjelpemidler (kode C): Enkel kalkulator (HP 30S)
Rottmann: *Matematisk formelsamling*

Sensurdato: 22.12.2005

Alle svar skal begrunnes, og det skal være med så mye mellomregning at fremgangsmåten fremgår tydelig av besvarelsen.

Oppgave 1 Bruk Laplacetransformasjonen til å løse initialverdi problemet

$$y' + y + \int_0^t y(\tau)e^{t-\tau} d\tau = u(t-1) \quad \text{for } t > 0, \quad y(0) = 1,$$

der u er trinnfunksjonen (step function).

Oppgave 2 La f være den 2π -periodiske funksjonen gitt ved $f(x) = x^4$ for $-\pi < x \leq \pi$. Det oppgis at f har Fourierrekke

$$\frac{\pi^4}{5} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8(-1)^n(\pi^2 n^2 - 6)}{n^4} \cos nx$$

Bruk dette til å finne summen av rekkene

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^2 n^2 - 6}{n^4} \quad \text{og} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^4 n^4 - 12\pi^2 n^2 + 36}{n^8}$$

Oppgave 3

a) Finn alle løsninger på formen $u(x, t) = F(x)G(t)$ av differensialligningen

$$(1) \quad u_{tt} + u_t = u_{xx} \quad \text{for} \quad 0 \leq x \leq \pi, \quad t \geq 0,$$

med randbetingelser

$$(2) \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t \geq 0.$$

b) Finn $u(x, t)$ som oppfyller (1) og (2) samt initialbetingelsene

$$u(x, 0) = 0 \quad \text{og} \quad u_t(x, 0) = \sin 4x.$$

Oppgave 4 Finn den Fouriertransformerte $\widehat{f}(w)$ av funksjonen

$$f(x) = e^{-|x|} \quad \text{for} \quad -\infty < x < \infty.$$

Bruk resultatet til å vise at

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos w}{1+w^2} dw = \frac{\pi}{2e}.$$

Oppgave 5


Gitt Poisson-ligningen

$$u_{xx} + u_{yy} = -1$$

i et område R , gitt ved

$$R = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1-x\},$$

og med $u(x, y) = 1$ på randen av R , se figuren til høyre.



La $u_{ij} \approx u(x_i, y_j)$, med $x_i = ih$ og $y_j = jh$.

Bruk skrittlengde $h = 0.25$ i både x - og y -retning og sett opp differanseligningene for u_{ij} i hvert av de indre punktene.

Finn u_{11} , u_{12} og u_{21} .

Oppgave 6 Gitt ligningssystemet

$$\begin{aligned} 4x_1 - 16x_2 + 4x_3 &= 2 \\ &- x_2 + 4x_3 = 4 \\ 4x_1 - x_2 &= 2. \end{aligned}$$

Kan dette systemet løses ved bruk av Jacobi-iterasjoner? Begrunn svaret.

Hvis ja: Utfør én Jacobi-iterasjon, med startverdiene $x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 1$.


Hvis nei: Skriv om systemet slik at du er sikker på at Jacobi-iterasjonene konvergerer. Utfør deretter én iterasjon, med startverdiene $x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 1$.

Oppgave 7

Denne oppgaven tar for seg en mekanisk svingekrets, der fjær-koeffisienten k avhenger av hvor mye fjæren strekkes eller klemmes sammen.

Med $m = 1$, $c = 0.5$ og $k(y) = 2 + y^2$ vil bevegelsen av kula i svingekretsen til høyre beskrives av ligningen

$$y'' + 0.5y' + 2y + y^3 = 0.$$



Skriv ligningen om til et system av første ordens ordinære differensialligninger.

La $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ og bruk Heuns metode med skrittlengde $h = 0.1$ til å finne tilnærmelser til $y(0.1)$ og $y(0.2)$.

Formler i numerikk

- La $p(x)$ være et polynom av grad $\leq n$ som interpolerer $f(x)$ i punktene $x_i, i = 0, 1, \dots, n$. Forutsatt at x og alle nodene ligger i intervallet $[a, b]$, så gjelder

$$f(x) - p(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\zeta) \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

Hvis nodene er jevnt fordelt (inkludert endepunktene), og $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$, da gjelder

$$|f(x) - p(x)| \leq \frac{1}{4(n+1)} M \left(\frac{b-a}{n} \right)^{n+1}$$

- Numerisk derivasjon:

$$f'(x) = \frac{1}{h} (f(x+h) - f(x)) - \frac{1}{2} h f''(\zeta)$$

$$f'(x) = \frac{1}{h} (f(x) - f(x-h)) + \frac{1}{2} h f''(\zeta)$$

$$f''(x) = \frac{1}{h^2} (f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)) - \frac{1}{12} h^2 f^{(4)}(\zeta)$$

- Newtons metode for ligningssystemet $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ er gitt ved

$$\mathbf{J}^{(k)} \cdot \Delta \mathbf{x}^{(k)} = -\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(k)})$$

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)}$$

- Iterative teknikker for løsning av et lineært ligningssystem

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{Jacobi : } x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

$$\text{Gauss-Seidel : } x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

- Heuns metode for løsning av $\mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y})$:

$$\mathbf{K}_1 = h \mathbf{f}(x_n, \mathbf{y}_n)$$

$$\mathbf{K}_2 = h \mathbf{f}(x_n + h, \mathbf{y}_n + \mathbf{K}_1)$$

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{1}{2} (\mathbf{K}_1 + \mathbf{K}_2)$$

Se også formlene i Rottmann.

Tabell over Laplacetransformerte

$f(t)$	$\mathcal{L}(f)$
1	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n ($n = 0, 1, 2, \dots$)	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s - a}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
$e^{at} \cos \omega t$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2}$
$e^{at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}$