



Faglig kontakt under eksamen:

Yurii Lyuibarskii 73 59 35 26 916 47 362

Eldar Straume 73 59 66 83 994 10 389

EKSAMEN I TMA4130 MATEMATIKK 4N

Bokmål
Mandag 9. august 2010
Tid: 09:00 – 13:00

Hjelpemidler (kode C): Enkel kalkulator (HP 30S)
Rottmann: *Matematisk formelsamling*

Sensur 30. august 2010.

Alle svar skal begrunnes, og det skal være med så mye mellomregning at fremgangsmåten fremgår tydelig av besvarelsen.

Oppgave 1

I denne oppgaven er a og b positive konstanter.

- a) Finn den inverse Laplacetransformen til funksjonen

$$e^{-as} \frac{1}{(s-b)^2}$$

- b) Bruk Laplacetransformasjonen til å løse initialverdiproblemet

$$y'' + 2y' + y = \delta(t-2), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1.$$

Oppgave 2

Funksjonen $f(x)$ er definert ved at $f(x) = x$ for $0 < x < \pi$, den er odde og periodisk med periode 2π . I tillegg har den "middelverdiegenskapen" hvilket betyr at $f(x) = \frac{1}{2} (f(x+0) + f(x-0))$ for alle x .

- a) Tegn grafen til $f(x)$ for $-2\pi \leq x \leq 3\pi$. Hva er verdien $f(3\pi)$?
- b) Bestem Fourierrekken til f , og bruk resultatet til å finne summen $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$.

Oppgave 3

- a) Finn alle funksjoner på formen $u(x, y) = F(x)G(y)$ som tilfredsstillers betingelsene

$$(I) \quad u_{xx} + 4u_{yy} = 0 \quad \text{for} \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < y < 2, \quad \text{og}$$

$$(II) \quad u(0, y) = u(\pi, y) = 0 \quad \text{for} \quad 0 \leq y \leq 2.$$

- b) Finn funksjonen $u(x, y)$ som i tillegg til (I) og (II) også tilfredsstillers

$$(III) \quad u(x, 0) = 0 \quad \text{og} \quad u(x, 2) = x(\pi - x) \quad \text{for} \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

Det oppgis at

$$x(\pi - x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx \quad \text{for} \quad 0 \leq x \leq \pi,$$

der

$$b_n = \begin{cases} \frac{8}{\pi} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3} & \text{for } n \text{ odde,} \\ 0 & \text{for } n \text{ like.} \end{cases}$$

Du kan godt uttrykke svaret ved hjelp av b_n .

Oppgave 4

Vi oppgir følgende Fouriertransform:

$$\mathcal{F} \left(e^{-ax^2} \right) = \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-\frac{w^2}{4a}}$$

Bruk dette til å finne verdiene av

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-w^2} \cos w \, dw \quad \text{og} \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-w^2} \sin w \, dw.$$

Oppgave 5

La R være det triangulære området i xy -planet bestemt av ulikhetene $0 < x < 1$ og $0 < y < 1 - x$, dvs det triangulære området med hjørner i $(0,0)$, $(1,0)$ og $(0,1)$. Vi skal løse følgende partielle differensialligning med randbetingelser i området R :

$$\begin{aligned} u_{xx}(x,y) + u_{yy}(x,y) - 16u(x,y) &= 16(x+y) \quad \text{for alle } (x,y) \in R, \\ u(x,0) = 0, \quad u(x,1-x) &= 0, \quad 0 \leq x \leq 1; \quad u(0,y) = 0, \quad 0 \leq y \leq 1. \end{aligned}$$

Bruk gitteret bestemt av punktene $(x_i, y_j) = (ih, jh)$, med $h = 0.25$. La $U_{i,j} \approx u(ih, jh)$ og bruk 5-punkts approksimasjonen for $u_{xx} + u_{yy}$ til å sette opp et ligningssystem for de tre ukjente verdiene $X = U_{1,1}$, $Y = U_{2,1}$ og $Z = U_{1,2}$ i det indre av området.

Oppgave 6

Utfør en iterasjon med Gauss-Seidels metode på ligningssystemet

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

med startverdiene $(x^{(0)}, y^{(0)}, z^{(0)})^T = (0, 0, 0)^T$.

Vi skriver de 3 ligningene i motsatt rekkefølge slik at vi ender opp med systemet

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Igjen, utfør en iterasjon med Gauss-Seidels metode med de samme startverdiene som før. Hvilken løsning er den mest nøyaktige?

Oppgave 7

Bruk Newtons dividerte differansers metode til å finne polynomet av grad høyst 4 som interpolerer datasettet

x	-1	1	2	3	5
f(x)	-7	-1	-4	-3	35