

**5.6.2** Vi søker  $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$  for  $F(s) = (s^3 + 2s^2 + 2)/[s^3(s^2 + 1)]$  og delbrøkkoppsummer

$$F(s) = \frac{s^3 + 2s^2 + 2}{s^3(s^2 + 1)} = \frac{A_3}{s^3} + \frac{A_2}{s^2} + \frac{A_1}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 1}.$$

For å bestemme  $A_1, A_2, A_3, B$  og  $C$ , multipliserer vi med fellesnevneren  $s^3(s^2 + 1)$  og sammenligner koeffisientene til  $s^n$  på begge sider av likhetstegnet.

$$s^3 + 2s^2 + 2 = A_3(s^2 + 1) + A_2s(s^2 + 1) + A_1s^2(s^2 + 1) + (Bs + C)s^3$$

(a) $[s^4]: 0 = A_1 + B$	(e) $A_3 = 2$ fra (e)
(b) $[s^3]: 1 = A_2 + C$	(d) $A_2 = 0$ fra (d)
(c) $[s^2]: 2 = A_3 + A_1$	som gir $A_1 = 2 - A_3 = 0$ fra (c)
(d) $[s^1]: 0 = A_2$	$C = 1 - A_2 = 1$ fra (b)
(e) $[s^0]: 2 = A_3$	$B = -A_1 = 0$ fra (a)

Dermed blir

$$F(s) = \frac{2}{s^3} + \frac{1}{s^2 + 1} \quad \text{og følgelig} \quad f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F) = t^2 + \sin t.$$

Vi kunne ha gjort delbrøkkoppsummeringen direkte her, uten å løse ligningssystem,

$$F(s) = \frac{s^3 + 2s^2 + 2}{s^3(s^2 + 1)} = \frac{s^3 + 2(s^2 + 1)}{s^3(s^2 + 1)} = \frac{1}{s^2 + 1} + \frac{2}{s^3}.$$

**5.6.3** Vi søker  $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$  for  $F(s) = (s^2 + 9s - 9)/(s^3 - 9s)$  og delbrøkkoppsummer

$$F(s) = \frac{s^2 + 9s - 9}{s^3 - 9s} = \frac{s^2 + 9s - 9}{s(s - 3)(s + 3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s - 3} + \frac{C}{s + 3}.$$

For å bestemme  $A, B, C$ , multipliserer vi med fellesnevneren  $s(s - 3)(s + 3)$ . Det gir

$$s^2 + 9s - 9 = A(s - 3)(s + 3) + Bs(s + 3) + Cs(s - 3).$$

Så setter vi inn  $s = 0, s = 3, s = -3$ , og får

$$-9 = A \cdot (-9), \quad A = 1; \quad 27 = B \cdot 18, \quad B = 3/2; \quad -27 = C \cdot 18, \quad C = -3/2.$$

Dermed blir

$$F(s) = \frac{1}{s} + \frac{3/2}{s - 3} - \frac{3/2}{s + 3} \quad \text{og følgelig} \quad f(t) = 1 + \frac{3}{2}e^{3t} - \frac{3}{2}e^{-3t} = 1 + 3 \sinh 3t.$$

**5.7.11** Vi skal løse initialverdiproblemet

$$\begin{aligned} y_1' &= -y_2 + 1 - u(t - 1), & y_1(0) &= 0 \\ y_2' &= y_1 + 1 - u(t - 1), & y_2(0) &= 0. \end{aligned}$$

Vi set  $Y_1 = \mathcal{L}\{y_1\}$ ,  $Y_2 = \mathcal{L}\{y_2\}$ . Ved å bruke formelen  $\mathcal{L}\{u(t-a)\} = \frac{1}{s}e^{-as}$  og derivasjonsregelen  $\mathcal{L}\{y'\} = sY - y(0)$  får vi

$$\begin{aligned} sY_1 + Y_2 &= \frac{1}{s} - \frac{1}{s}e^{-s}, \\ -Y_1 + sY_2 &= \frac{1}{s} - \frac{1}{s}e^{-s}. \end{aligned}$$

Eliminasjon av  $Y_1$  ( $Y_1 = sY_2 - \frac{1}{s} + \frac{1}{s}e^{-s}$  fra andre likning innsett i første likning) gir

$$Y_2 = \frac{1}{s(1+s^2)} + \frac{1}{s^2+1} - \frac{1}{s(1+s^2)}e^{-s} - \frac{e^{-s}}{1+s^2}.$$

Vi har  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{1+s^2}\right\} = \sin t$ . Av regelen  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}F(s)\right\} = \int_0^t f(\tau) d\tau$  får vi

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1+s^2}\right\} = \int_0^t \sin \tau d\tau = 1 - \cos t.$$

(Her kunne vi også bruke delbrøkspalting eller konvolusjonsregelen.) Ved også å bruke forskyvningsregelen  $\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = u(t-a)f(t-a)$  får vi då

$$\begin{aligned} y_2 &= 1 - \cos t + \sin t - u(t-1)[1 - \cos(t-1)] - u(t-1)\sin(t-1) \\ &= 1 - \cos t + \sin t + u(t-1)[-1 + \cos(t-1) - \sin(t-1)]. \end{aligned}$$

Innsetjing av uttrykket for  $Y_2$  i formelen  $Y_1 = sY_2 - \frac{1}{s} + \frac{1}{s}e^{-s}$  gir


$$Y_1 = -\frac{1}{s} + \frac{1}{1+s^2} + \frac{s}{1+s^2} + \frac{1}{s}e^{-s} - \frac{1}{1+s^2}e^{-s} - \frac{s}{1+s^2}e^{-s}$$

og dermed som ovanfor

$$\begin{aligned} y_1 &= -1 + \sin t + \cos t + u(t-1) - u(t-1)\sin(t-1) - u(t-1)\cos(t-1) \\ &= -1 + \sin t + \cos t + u(t-1)[1 - \sin(t-1) - \cos(t-1)]. \end{aligned}$$


### 10.1.8

$f(x) = x^2$  for  $-\pi < x < \pi$   
 $f(x+2\pi) = f(x)$  for alle  $x$   
 Grafen er tegnet for  $-3\pi \leq x \leq 3\pi$



### 10.1.13


$f(x) = \begin{cases} x & \text{for } -\pi \leq x \leq 0 \\ 0 & \text{for } 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$   
 $f(x+2\pi) = f(x)$  for alle  $x$   
 Grafen er tegnet for  $-3\pi \leq x \leq 3\pi$



10.2.1 Vi søker Fourierrekka for den  $2\pi$ -periodiske funksjonen  $f(x)$  gitt på figuren.

På intervallet  $-\pi < x < \pi$  er  $f(x)$  gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } -\pi < x < -\pi/2 \\ 1 & \text{for } -\pi/2 < x < \pi/2 \\ 0 & \text{for } \pi/2 < x < \pi \end{cases}$$



Eulerformlene for Fourierkoeffisientene, Kreyszig s.531/Rottman s.175 ( $L = \pi$ ), gir

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} dx = \frac{1}{2},$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos nx dx = \frac{\sin nx}{n\pi} \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{2 \sin n\pi/2}{n\pi}.$$

Følgelig er  $a_n = 0$  når  $n$  er partall, og

$$a_n = 2/n\pi \quad \text{når } n = 1, 5, 9, \dots, \quad a_n = -2/n\pi \quad \text{når } n = 3, 7, 11, \dots$$

For  $b_n$ -koeffisientene får vi

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin nx dx = -\frac{\cos nx}{n\pi} \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = 0$$

siden  $\cos u - \cos(-u) = 0$ , og dermed har  $f(x)$  Fourierrekke

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left( \cos x - \frac{1}{3} \cos 3x + \frac{1}{5} \cos 5x - + \dots \right).$$

Grafen til  $f(x)$  og de tre første partialsummene


$$S_1(x) = \frac{1}{2}, \quad S_2(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos x, \quad S_3(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left( \cos x - \frac{1}{3} \cos 3x \right)$$

i Fourierrekka til  $f(x)$  er tegnet over intervallet  $-\pi \leq x \leq \pi$ :

$f(x)$  og  $S_1(x)$

$f(x)$  og  $S_2(x)$

$f(x)$  og  $S_3(x)$



**10.2.17** Vi skal verifisere at for  $x = x_0$  er summen av Fourierrekka i Kreyszig 10.2 oppg. 1 lik

$$\frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2} \quad \text{hvis } f(x) \text{ er diskontinuerlig for } x = x_0.$$

(Her er  $f(x_0 + 0) = \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$  og  $f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$ .) Av grafen til  $f(x)$  i oppgave 1 ser vi at i intervallet  $-\pi \leq x \leq \pi$  er  $f(x)$  diskontinuerlig for  $x = \pm\pi/2$ . Vi ser også at

$$\frac{f(\pi/2 + 0) + f(\pi/2 - 0)}{2} = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{f(-\pi/2 + 0) + f(-\pi/2 - 0)}{2} = \frac{1 + 0}{2} = \frac{1}{2}.$$

Setter vi inn  $x = \pm\pi/2$  i Fourierrekka i oppgave 1, får vi

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left( \cos \left( \pm \frac{\pi}{2} \right) - \frac{1}{3} \cos \left( \pm \frac{3\pi}{2} \right) + \frac{1}{5} \cos \left( \pm \frac{5\pi}{2} \right) - + \dots \right) = \frac{1}{2}$$

siden alle cosinusleddene blir null. Dermed er påstanden verifisert.