

**11.3.17** Vi skal bruke metoden med separasjon av variable (produktmetoden) til å finne løsninger av den partielle differensielligningen  $u_{xy} - u = 0$ .

Vi setter  $u(x, y) = F(x)G(y)$  inn i differensielligningen  $u_{xy} = u$ , får

$$F'(x)G'(y) = F(x)G(y) \quad \text{og omformer til} \quad \frac{F'(x)}{F(x)} = \frac{G'(y)}{G(y)}.$$

Her avhenger venstresiden bare av  $x$  og høyresiden bare av  $y$ . Følgelig må uttrykket være konstant,  $F'(x)/F(x) = G'(y)/G(y) = k$ . Det gir to ordinære differensielligninger

$$F'(x) - kF(x) = 0 \quad \text{og} \quad kG'(y) - G(y) = 0$$

som begge er lineære. Differensielligningen  $y' + ay = 0$  har generell løsning  $y = Ce^{-ax}$ . Følgelig får vi her

$$F(x) = C_1 e^{kx} \quad \text{og} \quad G(y) = C_2 e^{y/k}.$$

Løsningene av  $u_{xy} - u = 0$  av formen  $u(x, y) = F(x)G(y)$  blir dermed

$$u(x, y) = C_1 e^{kx} \cdot C_2 e^{y/k} = C e^{kx+y/k}$$

der  $C = C_1 \cdot C_2$  og  $k \neq 0$  er vilkårlige konstanter.

**11.5.17** Oppgåva er eit spesialtilfelle av det problemet som blir gjennomgått i læreboka på sidene 606–607, med  $a = b = 24$ ,  $f(x) = 20$ . Vi får derfor løysing

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n^* \sin \frac{n\pi x}{24} \sinh \frac{n\pi y}{24},$$

der

$$A_n^* = \frac{2}{24 \sinh n\pi} \int_0^{24} 20 \sin \frac{n\pi x}{24} dx.$$

Vi finn at

$$I_n = \int_0^{24} \sin \frac{n\pi x}{24} dx = -\frac{24}{\pi n} \left[ \cos \frac{n\pi x}{24} \right]_0^{24} = \frac{24}{\pi n} [1 - \cos n\pi] = \frac{24}{\pi n} [1 - (-1)^n].$$

Dette gir  $I_{2m} = 0$ ,  $I_{2m+1} = \frac{48}{\pi(2m+1)}$ , og dermed

$$A_{2m}^* = 0, \quad A_{2m+1}^* = \frac{48 \cdot 2 \cdot 20}{\pi(2m+1) \cdot 24 \sinh(2m+1)\pi} = \frac{80}{\pi(2m+1) \sinh(2m+1)\pi}$$

Løysinga blir då

$$u(x, y) = \frac{80}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\sin \left( \frac{(2m+1)\pi x}{24} \right) \sinh \left( \frac{(2m+1)\pi y}{24} \right)}{(2m+1) \sinh(2m+1)\pi}.$$

**SIF5016 des 99 /oppgave 3** a) Separasjon av variable:

$$u(x, t) = F(x) \cdot G(t) : \quad FG'' - F''G + FG = 0, \quad F'(0) = 0, \quad F'(\pi) = 0$$

$$\frac{G''}{G} + 1 = \frac{F''}{F} = -\lambda \quad (\text{konstant})$$

$$(I) \quad F'' + \lambda F = 0, \quad F'(0) = 0, \quad F'(\pi) = 0, \quad (II) \quad G'' + (\lambda + 1)G = 0$$

$$(I) \quad \lambda < 0, \quad \lambda = -\alpha^2 : \quad F(x) = Ae^{\alpha x} + Be^{-\alpha x}, \quad F'(x) = \alpha Ae^{\alpha x} - \alpha Be^{-\alpha x}$$

$$F'(0) = 0, \quad F'(\pi) = 0 \Rightarrow A = B = 0, \quad F(x) = 0$$

$$\lambda = 0 : \quad F(x) = Ax + B, \quad F'(x) = A, \quad F'(0) = F'(\pi) = 0 \Rightarrow A = 0, \quad F_0(x) = 1$$

$$\lambda > 0, \quad \lambda = \alpha^2 : \quad F(x) = A \cos \alpha x + B \sin \alpha x, \quad F'(x) = -\alpha A \sin \alpha x + \alpha B \cos \alpha x$$

$$F'(0) = 0 \Rightarrow B = 0, \quad F'(\pi) = 0 \Rightarrow \alpha = n, \quad \lambda = n^2, \quad F_n(x) = \cos nx, \quad n \geq 1$$

$$(II) \quad \lambda = 0 : \quad G'' + G = 0, \quad G_0(t) = C_0 \cos t + D_0 \sin t$$

$$\lambda = n^2 : \quad G'' + (n^2 + 1)G = 0, \quad G_n(t) = C_n \cos \sqrt{n^2 + 1}t + D_n \sin \sqrt{n^2 + 1}t$$

$$u_0(x, t) = C_0 \cos t + D_0 \sin t$$

$$u_n(x, t) = (C_n \cos \sqrt{n^2 + 1}t + D_n \sin \sqrt{n^2 + 1}t) \cos nx, \quad n \geq 1$$

$$\text{dvs. } u_n(x, t) = (C_n \cos \sqrt{n^2 + 1}t + D_n \sin \sqrt{n^2 + 1}t) \cos nx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

b) Superposisjonprinsippet:

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} (C_n \cos \sqrt{n^2 + 1}t + D_n \sin \sqrt{n^2 + 1}t) \cos nx$$


$$u_t(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-C_n \sqrt{n^2 + 1} \sin \sqrt{n^2 + 1}t + D_n \sqrt{n^2 + 1} \cos \sqrt{n^2 + 1}t) \cos nx$$

$$1 + 2 \cos x = u(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cos nx \Rightarrow C_0 = 1, \quad C_1 = 2, \quad C_n = 0 \text{ for } n \geq 2$$

$$\cos 2x = u_t(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} D_n \sqrt{n^2 + 1} \cos nx \Rightarrow D_2 = 1/\sqrt{5}, \quad D_n = 0 \text{ for } n \neq 2$$

$$u(x, t) = \cos t + 2 \cos \sqrt{5}t \cos 2x + \frac{1}{\sqrt{5}} \sin \sqrt{5}t \cos 2x$$

**SIF5016 des 99 /oppgave 3** a)



$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} dx = \frac{1}{2}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \frac{\sin nx}{n\pi} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{2 \sin(n\pi/2)}{n\pi}$$

$a_n = 0$  for  $n$  partall,  $a_n = \frac{2}{n\pi}$  for  $n = 1, 3, 5, \dots$ ,  $a_n = -\frac{2}{n\pi}$  for  $n = 2, 4, 6, \dots$

$$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left( \cos x - \frac{\cos 3x}{3} + \frac{\cos 5x}{5} - \dots \right) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \cos(2m+1)x}{2m+1}$$

b)  $u(x, t) = F(x) \cdot G(t)$  innsettes i (1):

$$F''G = FG + FG', \quad \frac{F''}{F} = 1 + \frac{G'}{G} = k \quad (\text{konstant})$$

$$(I) \quad F'' - kF = 0, \quad F'(0) = 0, \quad F'(\pi) = 0, \quad (II) \quad G' - (k-1)G = 0$$

$$(I) \quad k > 0, \quad k = \mu^2 : \quad F(x) = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}, \quad F'(x) = \mu Ae^{\mu x} - \mu Be^{-\mu x}$$

$$F'(0) = F'(\pi) = 0 \Rightarrow A = B = 0, \quad F(x) = 0$$

$$k = 0 : \quad F(x) = A + Bx, \quad F'(x) = B$$

$$F'(0) = F'(\pi) = 0 \Rightarrow B = 0, \quad F(x) = 1, \quad (A = 1)$$

$$k < 0, \quad k = -p^2 : \quad F(x) = A \cos px + B \sin px, \quad F'(x) = -pA \sin px + pB \cos px$$

$$F'(0) = 0 \Rightarrow B = 0, \quad F'(\pi) = 0, \quad A \neq 0 \Rightarrow p = n, \quad F(x) = \cos nx, \quad (A = 1)$$

$$F(x) = \cos nx, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$(II) \quad k = -n^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots : \quad G' + (n^2 + 1)G = 0, \quad G(t) = Ce^{-(n^2+1)t}$$

Løsningene av (1) på formen  $u(x, t) = F(x)G(t)$  som tilfredsstiller (2):

$$u_n(x, t) = C_n e^{-(n^2+1)t} \cos nx, \quad C_n \text{ vilkårlig konstant, } n = 0, 1, 2, \dots$$

c) Superposisjonprinsippet:

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n e^{-(n^2+1)t} \cos nx \quad \text{oppfyller (1) og (2)}$$

$$f(x) = u(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cos nx \Rightarrow C_n = a_n \stackrel{a}{=} \begin{cases} 1/2 & \text{for } n = 0 \\ 2/(n\pi) & \text{for } n = 1, 3, 5, \dots \\ -2/(n\pi) & \text{for } n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} e^{-t} + \frac{2}{\pi} \left( e^{-2t} \cos x - \frac{1}{3} e^{-(3^2+1)t} \cos 3x + \frac{1}{5} e^{-(5^2+1)t} \cos 5x - \dots \right)$$

$$= \frac{1}{2} e^{-t} + \frac{2}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2m+1} e^{-[(2m+1)^2+1]t} \cos(2m+1)x, \quad 0 \leq x \leq \pi, \quad t > 0$$

Omformer:  $2 \cos x \cdot \cos 2x = \cos(x-2x) + \cos(x+2x) = \cos x + \cos 3x$

$$\cos x + \cos 3x = u(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cos nx \Rightarrow C_1 = 1, \quad C_3 = 1, \quad C_n = 0 \text{ ellers}$$

$$u(x, t) = e^{-(1^2+1)t} \cos x + e^{-(3^2+1)t} \cos 3x = e^{-2t} \cos x + e^{-10t} \cos 3x$$

**SIF5016 des 99 /oppgave 3** a) Vi bruker delvis integrasjon for å beregne  $b_1$ :

$$b_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi x \cos x \sin x dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi x \sin 2x dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[ -\frac{x}{2} \cos 2x \Big|_0^\pi + \underbrace{\int_0^\pi \frac{1}{2} \cos 2x dx}_0 \right] = \frac{1}{2\pi} \left( -\frac{\pi}{2} \right) = -\frac{1}{4}$$

Siden  $b_n = (-1)^n n / (n^2 - 1)$  for  $n \geq 2$ , har  $f(x) = (x/2) \cos x$  sinusrekke

$$\frac{x}{2} \cos x = -\frac{1}{4} \sin x + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n \sin nx}{n^2 - 1}, \quad 0 < x < \pi.$$

b) Vi setter inn  $u(x, t) = F(x)G(t)$  i ligningen (1) og separerer variable:

$$F''G = FG'' + 2FG', \quad \frac{F''}{F} = \frac{G'' + 2G'}{G} = k \quad (\text{konstant}), \quad F'' - kF = 0$$

$$G'' + 2G' - kG = 0$$

Randbetingelsene (2) medfører  $F(0) = F(\pi) = 0$  og, som i Kreyszig 11.3, får vi løsninger  $F(x) \not\equiv 0$  når  $k = -n^2$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ . Da blir  $F_n(x) = \sin nx$ .

Når  $k = -n^2$  får vi for  $G(t)$  ligningen

$$G'' + 2G' + n^2G = 0.$$

Den karakteristiske ligningen  $\lambda^2 + 2\lambda + n^2 = 0$  har løsning  $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$  når  $n = 1$  og  $\lambda_{1,2} = -1 \pm i\sqrt{n^2 - 1}$  når  $n > 1$ . Dermed blir

$$G_1(t) = (A_1 + B_1 t)e^{-t} \quad \text{for } n = 1$$

$$G_n(t) = e^{-t}(A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) \quad \text{for } n = 2, 3, \dots$$

der  $\omega_n = \sqrt{n^2 - 1}$  og  $A_n, B_n$  er vilkårlige konstanter. For  $u(x, t) = F(x)G(t)$  får vi

$$u_1(x, t) = F_1(x)G_1(t) = (A_1 + B_1 t)e^{-t} \sin x$$

$$u_n(x, t) = F_n(x)G_n(t) = e^{-t}(A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) \sin nx, \quad n = 2, 3, \dots$$

c) Siden ligningen (1) er lineær og homogen, er summen  $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t)$  også en løsning, og den oppfyller randbetingelsene (2). Vi setter følgelig

$$u(x, t) = (A_1 + B_1 t)e^{-t} \sin x + \sum_{n=2}^{\infty} e^{-t}(A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) \sin nx$$

og bestemmer koefisientene  $A_n$  og  $B_n$  for  $n = 1, 2, 3, \dots$  slik at initialbetingelsene (3) blir oppfylt. Leddvis derivasjon mhp. t gir

$$u_t(x, t) = [B_1 - (A_1 + B_1 t)]e^{-t} \sin x$$

$$+ \sum_{n=2}^{\infty} e^{-t} [(-\omega_n A_n \sin \omega_n t + \omega_n B_n \cos \omega_n t) - (A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t)] \sin nx.$$

Til bestemmelse av  $A_n$  og  $B_n$  får vi dermed, når vi bruker sinustekka i a) for  $(x/2) \cos x$ :

$$(i) \quad -\frac{1}{4} \sin x + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n \sin nx}{n^2 - 1} \stackrel{(3)}{=} u(x, 0) = A_1 \sin x + \sum_{n=2}^{\infty} A_n \sin nx$$

$$(ii) \quad 0 \stackrel{(3)}{=} u_t(x, 0) = (B_1 - A_1) \sin x + \sum_{n=2}^{\infty} (\omega_n B_n - A_n) \sin nx$$

Av (i) får vi  $A_1 = -1/4$  og  $A_n = (-1)^n n/(n^2 - 1)$  for  $n \geq 2$ . Av (ii) får vi  $B_1 - A_1 = 0$  og  $\omega_n B_n - A_n = 0$  for  $n \geq 2$ . Det gir  $B_1 = A_1$  og  $B_n = A_n/\omega_n$  for  $n \geq 2$ . Siden  $\omega_n = \sqrt{n^2 - 1}$ , blir svaret

$$u(x, t) = -\frac{1}{4}(1+t)e^{-t} \sin x + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n \sin nx}{n^2 - 1} e^{-t} \left( \cos \sqrt{n^2 - 1} t + \frac{\sin \sqrt{n^2 - 1} t}{\sqrt{n^2 - 1}} \right).$$