



Kontaktperson:
Sverre O. Smalø
735 – 91750

MIDTSEMESTERPRØVE I FAG TMA4140 DISKRET MATEMATIKK

Torsdag 7. oktober 2004

Tid : 08.15-10.00

Tillatte hjelpemidler (Kode C): Enkel kalkulator (HP30S);
Rottmann: Matematisk formelsamling.

INSTRUKSJONER

- 1) Oppgavesettet skal ikke åpnes før dere får beskjed om det.
- 2) Oppgavesettet har 10 oppgaver. Det er 8 flervalgsoppgaver der ett eller flere av svaralternativene er riktige. Det er to enkeltoppgaver som krever begrunnelser.
- 3) Svarene på flervalgsoppgavene gis ved at riktig(e) alternativ krysses av på eget ark som du finner bakerst i oppgavesettet, mens svarene på de to enkeltoppgavene leveres på separate ark som dere får av eksamensvaktene.
- 4) Hvert riktig svar på en flervalgsoppgave gir ett poeng, mens hvert galt svar gir ett poeng i trekk. Flervalgsoppgavene teller 80% av settet, mens de to enkeltoppgavene teller 20%.
- 5) Du skal levere svararket på flervalgsoppgave sammen med oppgavesettet. Pass på at studentnummeret ditt er skrevet på alle ark som leveres inn.

1. Hvilke av utsagnene under er ekvivalent med utsagnet $(\neg p \vee q) \rightarrow r$, der p , q og r er utsagn?
- a) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$
 - b) $(p \wedge \neg q) \vee r$
 - c) $\neg r \rightarrow (p \wedge \neg q)$
 - d) $(p \vee \neg q) \wedge r$

LØSNING: a), b) og c) er korekte.

2. Hvilke av utsagnene under er ekvivalent med utsagnet $\neg(\forall x \exists y (P(x, y)))$, der $P(x, y)$ er en utsagnsfunksjon i to variable?
- a) $\neg(\forall y \exists x (P(y, x)))$
 - b) $\exists x \forall y (\neg(P(x, y)))$
 - c) $\exists x \exists y (\neg(P(x, y)))$
 - d) $\forall x \exists y (\neg(P(x, y)))$

LØSNING: a) og b) er korekte.

3. La M være en endelig mengde med m elementer og N en endelig mengde med n elementer. Hvilke av påstandene under er korekte?
- a) Potensmengden til M har 2^m elementer.
 - b) Antall funksjoner fra M til N er m^n
 - c) Antall funksjoner fra M til N som er injektive er $m! - n!$.
 - d) $m = n$ hvis og bare hvis det finnes en bijeksjon fra M til N .

LØSNING: a) og d) er korekte.

4. La $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ være funksjonen gitt ved $f(n) = 2^n + n!$. Hvilke av påstandene under er korrekte?
- a) $f(x)$ er $O(2^n)$
 - b) $f(x)$ er $O(n!)$
 - c) $f(x)$ er $\Omega(2^n)$
 - d) $f(x)$ er $\Omega(n!)$

LØSNING: b), c) og d) er korekte.

5. Hvilke av tallene nedenfor er løsning til følgende systemet av lineære kongruenser?

$$x \equiv 17 \pmod{19}$$

$$x \equiv 21 \pmod{23}$$

$$x \equiv 15 \pmod{17}$$

a) 435

b) 7427

c) 389

d) -2

LØSNING: b) og d) er korekte.

6. Hvilke av tallene nedenfor er invers til 28 modulo 29?

a) 5

b) 7

c) 14

d) 28

LØSNING: d) er korrekt.

7. Hvilke av tallene nedenfor er kongruente med $2^{2^{10}}$ modulo 31?

a) 2

b) 4

c) 8

d) 16

LØSNING: d) er korrekt.

8. La skriftegnene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E og F representere tallene mellom 0 og 15 i det hexadesimale tallsystemet. Hvilke av tallene i desimalsystemet, det oktale tallsystemet, 4-tallsystemet og det binære tallsystemet representerer tallet $(2AE0B)_{16}$

a) $(175627)_{10}$

b) $(527012)_8$

c) $(222320023)_4$

d) $(101010111000001010)_2$

LØSNING: a) og c) er korekte.

9. La $H_n = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n$ for $n \geq 2$. Vis ved hjelp av induksjon at $H_{2^n} \geq 1 + n/2$ for all $n \geq 2$.

LØSNING: $H_{2^n} = 1 + 1/2 + \dots + 1/2^n$. Vi må sjekke at påstanden holder for $n = 1$. Dvs. $H_{2^1} \geq 1 + 1/2$. Høyre side av den ulikheten er $H_{2^1} = H_2 = 1 + 1/2$ så ulikheten holder for $n = 1$.

La oss nå anta at påstanden holder for en $k \geq 1$, og vi vil vise at den da også holder for $k + 1$. Vi ser da på

$$H_{2^{k+1}} = 1 + 1/2 + \dots + 1/2^k + 1/(2^k + 1) + \dots + 1/2^{k+1} = H_{2^k} + 1/(2^k + 1) + 1/(2^k + 2) + \dots + 1/(2^k + 2^k).$$

Nå vil den siste delen av summen i uttrykket over ha 2^k ledd og hvert ledd er større enn eller likt det siste leddet som er $1/2^{k+1}$. Vi får derfor at summen av de siste leddene er større enn $2^k/2^{k+1} = 1/2$. Ved å bruke induksjonsantagelsen får vi da

$$H_{2^{k+1}} \geq H_{2^k} + 1/2 \geq 1 + k/2 + 1/2 = 1 + (k + 1)/2$$

der induksjonsantagelsen brukes i den andre ulikheten. Dette beviser at induksjonssteget holder. Ved induksjon følger nå påstanden.

10. Bruk Euclids algoritme til å finne inversen til 9 modulo 13.

LØSNING:

$$13 = 9 + 4$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

Ved å sette inn får vi da $1 = 9 - 2 \cdot 4 = 9 - 2(13 - 9) = 3 \cdot 9 - 2 \cdot 13$. Inversen til 9 modulo 13 blir da 3. (En kan erstatte 3 med alle tall som er kongruent med 3 modulo 13, ie alle tall på formen $3 + k13$ der k er et helt tall.)