



Flervalgsoppgavene er frivillige, men er pensum og er anbefalt, som en støtte for læring.

Obs: Disse oppgavene kan også formuleres som langsvarsoppgaver. I dette tilfellet må, ved eksamen, alle svar begrunnes. I tillegg, må du ta med så mye mellomregning at fremgangsmåten kommer tydelig fram fra besvarelsen din.

- 1 La  $V = \mathbb{P}_4$  være polynomrommet av alle polynomer i en ukjent  $x$  av grad høyst 4 med koeffisienter i  $\mathbb{R}$ . La  $T: V \rightarrow V$  være lineærtransformasjonen gitt ved at

$$T(f(x)) = xf'(x)$$

for et polynom  $f(x)$  i  $V$ , der  $f'(x)$  er den deriverte av polynomet  $f(x)$  med hensyn til  $x$ .

- a) La  $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3, x^4\} \subseteq V$ , som er en basis for  $V$  som vektorrom over  $\mathbb{R}$ . Matriserepresentasjonen av  $T$  med hensyn til  $\mathcal{B}$  er gitt ved:

$$(i) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/4 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- b) La  $\mathcal{B}' = \{1, (1+x), (1+x)^2, (1+x)^3, (1+x)^4\} \subseteq V$ , som er en basis for  $V$  som vektorrom over  $\mathbb{R}$ . Matriserepresentasjonen av  $T$  med hensyn til  $\mathcal{B}'$  er gitt ved:

$$(i) \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

2] La  $\mathcal{B}' = \{(1, 1), (-1, 1)\}$  i  $\mathbb{R}^2$ , som er en basis for  $\mathbb{R}^2$ . La  $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$  være standardbasisen for  $\mathbb{R}^2$ .

a) Overgangsmatrisen fra basisen  $\mathcal{B}'$  til basisen  $\mathcal{B}$  er gitt ved:

$$(i) \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

b) Overgangsmatrisen fra basisen  $\mathcal{B}$  til basisen  $\mathcal{B}'$  er gitt ved:

$$(i) \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

3] Hvis vi tenker på elementer/punkter  $\mathbf{x}$  i  $\mathbb{R}^n$  som kolonnevektorer  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ . Da kan

vi tolke/definere

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$$

for  $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$ , hvor det siste produktet er vanlig matrisemultiplikasjon.

Hvilke av de følgende regnereglene for vektorer  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  i  $\mathbb{R}^n$  og reelle tall  $s$ ,  $t$  i  $\mathbb{R}$

- (1)  $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$ ,  $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$ ,
- (2)  $t(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = t\mathbf{a} + t\mathbf{b}$ ,  $t(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = t\mathbf{a} - t\mathbf{b}$ ,
- (3)  $(s + t)\mathbf{a} = s\mathbf{a} + t\mathbf{a}$ ,  $(s - t)\mathbf{a} = s\mathbf{a} - t\mathbf{a}$ ,
- (4)  $(t\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (t\mathbf{b}) = t(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ ,
- (5)  $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$ ,  $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ ,
- (6)  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ ,  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$ , dvs.  $|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$ ,
- (7)  $|t\mathbf{a}| = |t| \cdot |\mathbf{a}|$ ,
- (8)  $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|$ ,
- (9)  $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$ ,

følger av regnereglene for matriser  $A$ ,  $B$  og  $C$

- (1)  $A(B + C) = AB + AC$ ,
- (2)  $A(B - C) = AB - AC$ ,
- (3)  $(A + B)C = AC + BC$ ,
- (4)  $(A - B)C = AC - BC$ ,
- (5)  $(AB)C = A(BC)$ ,
- (6)  $A + B = B + A$ ,  $A + (B + C) = (A + B) + C$ ,
- (7)  $A(aC) = (aA)C = a(AC)$  hvis  $a$  er et reelt tall?

- (i) (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).
- (ii) (1), (2), (3), (4), (5).
- (iii) (1), (2), (3).

Blir det noen endring når vi tar med regneregler for transponerte av matriser:  $(tA)^T = tA^T$  og  $(AB)^T = B^T A^T$ .

- 4 a) La  $\mathbf{u} = (1, -2, 3)$  og  $\mathbf{v} = (2, -1, -3)$  i  $\mathbb{R}^3$ . Hvor er det regnet feil?
- (i)  $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3, -3, 0)$ .
  - (ii)  $2\mathbf{u} - \mathbf{v} = (-1, -3, 9)$ .
  - (iii)  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -5$ .
- b) La  $t \in \mathbb{R}$  og  $\mathbf{u}$ ,  $\mathbf{v}$  i  $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$  være slik at  $(\mathbf{u} - t\mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$ , og la  $\theta$  være vinkelen mellom  $\mathbf{u}$  og  $\mathbf{v}$ . Hva er forholdet mellom  $|t\mathbf{v}|$  og  $|\mathbf{u}| \cos(\theta)$ :
- (i)  $|t\mathbf{v}|$  og  $|\mathbf{u}| \cos(\theta)$  er aldri like.
  - (ii)  $|t\mathbf{v}| = |\mathbf{u}| \cos(\theta)$ .
  - (iii)  $|t\mathbf{v}| > |\mathbf{u}| \cos(\theta)$ .